




BİTKİ BESLEME ÜRÜN KATALOĞU



Hosgeldiniz



CANDEM
GÜBRE
A.Ş.



Hakkımızda

“Doğanın bereketini sürdürülebilir tarımla buluşturan lider güç”

Candem Gübre Ailesi olarak, tarıma olan tutkumuzu 30 yılın birikimi ve uzmanlığımızla harmanlayarak; sektörde sürdürülebilirliği sağlama ve özel gübre alanında öncü olma misyonumuzu her daim vurguladık.


Projeksiyonumuzu; sürekli gelişim, yenilikçi kalite ve müşteri memnuniyetine dayalı bir anlayış üzerine inşa ettik. Bu yaklaşım, kuruluşumuzdan bu yana sektörün kalite standartlarını yeniden tanımlamamızı sağladı. Ortaya koyduğumuz her ürün, titizlikle sürdürülen çalışmalarımızın bir sonucu olarak sektördeki sorumluluğumuzu perçinlemektedir.

Bugün, tarımsal üretime değer katmanın ve bu başarılarımızı küresel tarım sektörüyle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Candem Gübre Ailesi olarak; bilinçli üretici, bilinçli tüketici sloganıyla hareket ediyor, doğanın bereketini artırmak amacıyla organik gübreler üretiyoruz. Çiftçimizin daha verimli, sağlıklı ve ekonomik ürünlere ulaşmasını sağlamak adına tüm bilgi birikimimizi paylaşıyor; tarımda fark yaratan çözüm ortakları olarak öncülüğümüzü sürdürüyoruz.

Doğru hammaddenin seçimi ve ileri teknolojinin kullanımıyla üretilen gübrel-erimiz, tarım sektöründe kalitenin simgesi haline gelmiştir. Bitkilerin fizyolojik gereksinimlerini dikkate alarak hazırlanan ürünlerimiz, her alanda yüksek verim sağlama amacı taşımaktadır. Hedefimiz, kalıntısız, ekonomik ve yüksek kaliteli ürünlerle tarım sektörünü desteklemektir.

Müşteri odaklı hizmet anlayışımız, yalnızca satış aşamasında değil, satış sonrası hizmetlerde de mükemmellik standardımızı korumaktadır. İthalat ve ihracat konusundaki uzmanlığımız, sektördeki küresel gelişmeleri yakından takip eden proaktif bir yaklaşımı temel alır. Birçok ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatla, Candem Gübre A.Ş. olarak global alanda güvenilir bir marka olmaya devam ediyoruz.

CANDEM GÜBRE A.Ş.



İçindekiler

01 - 07

DAMLAMA GÜBRELER

08 - 11

YAVAŞ SALINIMLI AZOTLU GÜBRELER

12 - 21

YAPRAK GÜBRELER

22 - 30

KİMYEVİ GÜBRELER

31 - 45

ORGANİK GÜBRELER

46 - 55

ORGANOMİNERAL GÜBRELER

56 - 62

İKİNCİL BESİN GÜBRELER

63 - 75

İZ ELEMENTLİ GÜBRELER

76 - 77

SET GÜBRELER

78 - 81

PH DÜŞÜRÜCÜ-TUZLULUK GİDERİCİ



**CANDEM
GÜBRE
A.Ş.**



**DAMLAMA
GÜBRELER**



EC FERTILIZER

SOLUTECH

NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ (KLORSUZ)

FORMÜLLER

	TOPLAM AZOT	AMONYUM AZOTU	NİTRAT AZOTU	ÜRE AZOTU	Nötral Amonyum Sitratta ve Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P ₂ O ₅)	Suda Çöz. P ₂ O ₅	Suda Çöz. K ₂ O	Suda Çöz. SO ₃
15 - 30 - 15	15	7	1	7	30	30	15	
15 - 5 - 35	15	1	6,5	7,5	5	5	35	
7 - 7 - 40	7	1,4	2	3,6	7	7	40	
20 - 20 - 20	20	4	5,6	10,4	20	20	20	
18 - 18 - 18 + (5 SO ₃)	18	5,5	1	11,5	18	18	18	5
20 - 10 - 20 + (7 SO ₃)	20	4,6	1	14,4	10	10	20	7
16 - 8 - 24 + (10 SO ₃)	16	5,3	1	9,7	8	8	24	10

BİTKİLER	DOZU	UYGULAMA ŞEKLİ
Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik	250 – 500 g / da	Kardeşlenme döneminde yapraktan
Şeker Pancarı, Patates, Havuç	250 – 500 g / da	Birinci, İkinci, Üçüncü çapadan sonra yapraktan
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Kabak, Karpuz	2,5 – 5 Kg / da	Sezon boyunca topraktan 7-15 günde bir damlama sulama ile
Marul, Tere, Maydanoz, Roka	250 – 500 g / da	Sezon boyunca 3-4 hafta ara ile yapraktan
Meyve Ağaçları	2 – 4 Kg / 100 L su	Sezon boyunca 3-4 hafta ara ile yapraktan





EC FERTILIZER

HIGHLINE

NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ (KLORSUZ)

FORMÜLLER

	TOPLAM AZOT	AMONYUM AZOTU	NİTRAT AZOTU	ÜRE AZOTU	Nötral Amonyum Sitratta ve Suda Çözünür (P ₂ O ₅)	Suda Çöz. P ₂ O ₅	K ₂ O
15 - 30 - 15	15	5,9	4,2	4,9	30	30	15
10 - 52 - 10	10	8,6	1,4		52	52	10
10 - 40 - 10	10	10			40	40	10
29 - 5 - 5	29	14,3	14,7		5	5	5
18 - 18 - 18	18	6,5	5	6,5	18	18	18
16 - 8 - 24	16	6,6	6,8	2,6	8	8	24
20 - 10 - 20	20	6,3	5,7	8	10	10	20
20 - 20 - 20	20	3,9	5,7	10,4	20	20	20

BİTKİLER	DOZU	UYGULAMA ŞEKLİ
Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik	250 – 500 g / da	Kardeşlenme döneminde yapraktan
Şeker Pancarı, Patates, Havuç	250 – 500 g / da	Birinci, İkinci, Üçüncü çapadan sonra yapraktan
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Kabak, Karpuz	2,5 - 5 Kg / da	Sezon boyunca topraktan 7-15 günde bir damlama sulama ile
Marul, Tere, Maydanoz, Roka	250 – 500 g / da	Sezon boyunca 2-3 hafta ara ile yapraktan
Meyve Ağaçları	2 - 4 Kg / 100 L su	Sezon boyunca 3-4 hafta ara ile yapraktan





EC FERTILIZER

AGROFERT

NPK - NK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ (KLORLU)

FORMÜLLER

	TOPLAM AZOT	AMONYUM AZOTU	ÜRE AZOTU	Nötrül Amonyum Sitratta (P ₂ O ₅) Suda Çözünür	Suda Çöz. P ₂ O ₅	K ₂ O
15 - 30 - 15	15	6,1	8,9	30	30	15
20 - 10 - 20	20	4	16	10	10	20
5 - 5 - 40	5	5		5	5	40
13 - 0 - 44	13		13			44
20 - 20 - 20	20	4	16	20	20	20
18 - 18 - 18	18	6,5	11,5	18	18	18
16 - 8 - 24	16	7	9	8	8	24
15 - 5 - 30	15	4	11	5	5	30

BİTKİLER	DOZU	UYGULAMA ŞEKLİ
Buğday, Arpa, Mısır, Yulaı, Çeltik, Çavdar v.b	250 – 500 g / da	Kardeşlenme döneminde yapraktan
Şeker Pancarı, Patates, Havuç	250 – 500 g / da	1. 2. ve 3. çapadan sonra yapraktan
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Kabak	2,5 - 5 Kg / da	Sezon boyunca topraktan 7-15 günde bir damlama sulama ile
Marul, Tere, Maydanoz, Roka	250 – 500 g / da	Sezon boyunca 2-3 hafta ara ile yapraktan
Meyve Ağaçları	2 - 4 Kg / 100 L su	Sezon boyunca 2-3 hafta ara ile yapraktan
Topraktan Uygulama	1 - 2 kg / dekar	





EC FERTILIZER

MULTI-CHEM

NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ (KLORLU)

FORMÜLLER

	TOPLAM AZOT	AMONYUM AZOTU	NİTRAT AZOTU	ÜRE AZOTU	Nitrat Amonyum Sitrattı P2O5 ve Suda Çözünür	Suda Çöz. P2O5	K2O
20 - 10 - 20	20	9,6	10,4		10	10	20
10 - 20 - 10	10	10			20	20	10
15 - 5 - 30	15	4		11	5	5	30
10 - 10 - 40	10	2		8	10	10	40
15 - 30 - 15	15	6,1		8,9	30	30	15
20 - 20 - 20	20	4		16	20	20	20
16 - 8 - 24	16	8,8	7,2		8	8	24
18 - 18 - 18	18	6,5		11,5	18	18	18
10 - 30 - 10	10	8	2		30	30	10

BİTKİLER	DOZU	UYGULAMA ŞEKLİ
Buğday, Arpa, Mısır, Yulaf, Çeltik, Çavdar v.b	250 – 500 g / da	Kardeşlenme döneminde yapraktan
Şeker Pancarı, Patates, Havuç	250 – 500 g / da	1. 2. ve 3. çapadan sonra yapraktan
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Kabak	2,5 - 5 Kg / da	Sezon boyunca topraktan 7-15 günde bir damlama sulama ile
Marul, Tere, Maydanoz, Roka	250 – 500 g / da	Sezon boyunca 2-3 hafta ara ile yapraktan
Meyve Ağaçları	2 - 4 Kg / 100 L su	Sezon boyunca 2-3 hafta ara ile yapraktan
Topraktan Uygulama	1 - 2 kg / dekar	





EC FERTILIZER

CANFiT

NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ (KLORLU)

FORMÜLLER

FORMÜLLER	TOPLAM AZOT	AMONYUM AZOTU	NİTRAT AZOTU	ÜRE AZOTU	Nötrül Amonyum Stratta P ₂ O ₅	Suda Çöz. P ₂ O ₅	K ₂ O	Suda Çöz. (SO ₃)
20 - 10 - 20	20	4		16	10	10	20	
15 - 30 - 15	15	6,1		8,9	30	30	15	
15 - 5 - 30	15	4		11	5	5	30	
20 - 20 - 20	20	4		16	20	20	20	
18 - 18 - 18	18	6,5		11,5	18	18	18	
16 - 8 - 24	16	7		9	8	8	24	
5 - 5 - 40	5	5			5	5	40	
30 - 10 - 10 + (6 SO ₃)	30	4,2		25,8	10	10	10	6
25 - 5 - 10 + (25 SO ₃)	25	9,8		15,2	5	5	10	25

BİTKİ	UYGULAMA DOZU	UYGULAMA ŞEKLİ
Buğday, Arpa, Mısır, Yulaf, Çeltik, Çavdar v.b	250 – 500 g / da	Kardeşlenme döneminde yapraktan
Şeker Pancarı, Patates, Havuç	250 – 500 g / da	1.2. ve 3. çapadan sonra yapraktan
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Kabak	2,5 - 5 Kg / da	Sezon boyunca topraktan 7-15 günde bir damlama sulama ile
Marul, Tere, Maydanoz, Roka	250 – 500 g / da	Sezon boyunca 2-3 hafta ara ile yapraktan
Meyve Ağaçları	2 - 4 Kg / 100 L su	Sezon boyunca 2-3 hafta ara ile yapraktan
Topraktan Uygulama	1 - 2 kg / dekar	Damlama sulama sistemi ile tercihen dekarla en az 100 LT su ile birlikte uygulanır.



25kg

GROW DRİP



EC FERTİLİZER

GROW DRİP 11-42-6+(3 MgO)+TE

NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	W/W
Toplam Azot (N)	% 11
Üre Azotu (N-NH ₂)	% 4.5
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	% 6.5
Nötral Amonyum Sitratta ve Suda Çöz.	
Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	% 42
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	% 42
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 6
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	% 3
Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır	% 2
Suda Çözünür Demir (Fe) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır	% 0.05
Suda Çözünür Mangan (Mn) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır	% 0.04
Suda Çözünür Bor (B)	% 0.03
Suda Çözünür Bakır (Cu) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır	% 0.02
Suda Çözünür Molibden (Mo)	% 0.01

EC FERTİLİZER

GROW DRİP 20-17,5-15+(4 MgO)+TE

NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	W/W
Toplam Azot (N)	% 20
Bi Üresi Düşük Üre (N-NH ₂)	% 15
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	% 2
Nötral Azotu (N-NO ₃)	% 3
Nötral Amonyum Sitratta Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	% 17.5
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	% 17.5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 15
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	% 4
Suda Çözünür Demir (Fe) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır	% 0.05
Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır	% 0.04
Suda Çözünür Mangan (Mn) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır	% 0.03
Suda Çözünür Bor (B)	% 0.02
Suda Çözünür Bakır (Cu) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır	% 0.01
Suda Çözünür Molibden (Mo)	% 0.005

EC FERTİLİZER

GROW DRİP 10-5-40+(5 CaO)+TE

NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	W/W
Toplam Azot (N)	% 10
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	% 10
Nötral Amonyum Sitratta Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	% 5
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	% 5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 40
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	% 5
Suda Çözünür Demir (Fe) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır	% 0.05
Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır	% 0.04
Suda Çözünür Mangan (Mn) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır	% 0.03
Suda Çözünür Bor (B)	% 0.02
Suda Çözünür Bakır (Cu) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır	% 0.01
Suda Çözünür Molibden (Mo)	% 0.005

BİTKİ	DAMLAMA UYGULAMA	YAPRAK UYGULAMA	UYGULAMA ŞEKLİ
Örtü altı bitkileri	2 - 3 kg	200 - 300 gr	Döl tutumu döneminden hasata kadar 2'şer hafta ara ile en az 3-4 uygulama yapılır.
Açık alan bitkileri	2 - 3 kg	200-300 gr / 100 L 2-3 Kg /da Yağmurlama	Döl tutumu döneminden hasata kadar 2'şer hafta ara ile en az 3-4 uygulama yapılır.
Yumru lu bitkiler	2 - 3 kg	200-300 gr / 100 L 2-3 Kg /da Yağmurlama	Yumru bağlandıktan 1.5-2 ay sonra 2-3'er hafta ara ile en az 3 uygulama tavsiye edilir.
Narenciye	2 - 3 kg	200 - 300 gr	Meyveler yaklaşık fındık büyüklüğüne eriştikten sonra 2-3'er hafta ara ile en az 3 uygulama yapılır
Sert çekirdekli meyveler	2 - 3 kg	200 - 300 gr	Meyveler yaklaşık fındık büyüklüğüne eriştikten sonra 2-3'er hafta ara ile en az 3 uygulama yapılır
Yumuşak çekirdekli meyveler	2 - 3 kg	200 - 300 gr	Meyveler yaklaşık fındık büyüklüğüne eriştikten sonra 2-3'er hafta ara ile en az 3 uygulama yapılır
Pamuk	2 - 3 kg	200-300 gr / 100 L 2-3 Kg /da Yağmurlama	Kozalar yaklaşık fındık büyüklüğüne eriştikten sonra 2-3'er hafta ara ile en az 3 uygulama yapılır



CANDEM
GÜBRE
A.Ş.



YAVAŞ SALINIMLI AZOTLU
GÜBRELER



EC FERTILIZER

AZO-21 AMONYUM SÜLFAT

NİTRİFİKASYON İNHİBİTÖRLÜ (DİCYANDİAMİDE)

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Amonyum Azotu (N-NH₄)
Nitrifikasyon İnhibitörü (DCD)
Klor (Cl) Beyanı

W/W

% 20,4
% 0,7
% 0,09

BİTKİ	DAMLAMA UYGULAMA (Dekar)	YAPRAK UYGULAMA (100 L)	UYGULAMA ŞEKLİ
ÖRTÜ ALTI BİTKİLERİ	10-15 kg	-	Döl tutumu döneminden hasada kadar 2'şer hafta ara ile en az 3-4 uygulama yapılır.
AÇIK ALAN BİTKİLER	20-25 kg	-	Döl tutumu döneminden hasada kadar 2'şer hafta ara ile en az 3-4 uygulama yapılır.
YUMRULU BİTKİLER	20-25 kg	-	Yumru bağlandıktan 1,5-2 ay sonra 2-3'er hafta ara ile en az 3 uygulama tavsiye edilir.
NARENCİYE	20-25 kg	-	Meyveler yaklaşık fındık büyüklüğüne eriştikten sonra 2-3'er hafta ara ile en az 3 uygulama yapılır.
SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELER	20-25 kg	-	Meyveler yaklaşık fındık büyüklüğüne eriştikten sonra 2-3'er hafta ara ile en az 3 uygulama yapılır.
YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVELER	20-25 kg	-	Meyveler yaklaşık fındık büyüklüğüne eriştikten sonra 2-3'er hafta ara ile en az 3 uygulama yapılır.
PAMUK	20-25 kg	-	Kozalar yaklaşık fındık büyüklüğüne eriştikten sonra 2-3'er hafta ara ile en az 3 uygulama yapılır.





EC FERTILIZER

AZO-ASN AMONYUM SÜLFAT-NİTRAT

NİTRİFİKASYON İNHİBİTÖRLÜ (DİCYANDİAMİDE)

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)	% 26
Nitrat Azotu (N-NO ₃)	% 10
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	% 16
Nitrifikasyon İnhibitörü (DCD)	% 0,6

BİTKİ	UYGULAMA DOZU	UYGULAMA ŞEKLİ
AÇIK ALAN SEBZELERİ	25 - 50 kg/da	TOPRAKTAN
MEYVE AĞAÇLARINDA	1-3 kg/da	TOPRAKTAN
TARLA BİTKİLERİ	25 - 50 kg/da	TOPRAKTAN
MISIR	40-50 kg/da	TOPRAKTAN





EC FERTILIZER

AZO-46 ÜRE

NİTRİFİKASYON İNHİBİTÖRLÜ (DİCYANDİAMİDE)

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Üre Azotu (N-NH₂)
Nitrifikasyon İnhibitörü (DCD)

W/W

% 45
% 1,2

BİTKİ	UYGULAMA DOZU	UYGULAMA ŞEKLİ		
AÇIK ALAN SEBZELERİ	5-10 kg/da	Çeltikten sonra ve meyve öncesi topraktan		
TARLA BİTKİLERİ (HUBUBAT)	20-25 kg/da	YAŞ	(g) Azot/Ağaç	(kg) Azot/Dekar
		1	-	-
		2	100	2,5 kg
		3-5	100-150	3-4 kg
		6-7	200-250	6 kg
		7 >	300-500	8-12 kg
ÇELTİK	15-25 kg/da	Fide devresi, Kardeşlenme, Salkım oluşumunda topraktan		
TARLA BİTKİLERİ	25-40 kg/da	Ekimden sonra, Tarla dönemi boyunca topraktan		



**CANDEM
GÜBRE
A.Ş.**



**YAPRAK
GÜBRELERİ**



EC FERTILIZER

MASTER PLANT 0-20-20+(15 CaO)+TE

PK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Nötral Amonyum Sitratta ve Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P₂O₅)

Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P₂O₅)

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)

Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)

Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile Şelatlı

EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı Çinko (Zn)

w/w

% 20

% 20

% 20

% 15

% 2

2-9

BİTKİ		UYGULAMA DOZU	UYGULAMA ŞEKLİ
Sebzeler	Domates, Salatalık, Kabak, Biber, Patlıcan	250 g / 100 L Su	Erken ilkbahar döneminde ve sezon boyunca yaprakтан veya damlamayla uygulanır.
		2 Kg / dekar	
	Maydanoz, Roka, Dereotu, Marul, Semizotu, Ispanak, Brokoli, Karnabahar, Pırasa, Lahana	200 g / 100 L Su	Bitki gelişim döneminde yaprakтан uygulanır
		1,5 Kg / dekar	
Yumru Bitkiler	Pancar, Patates, Havuç, Şalgam, Turp, Soğan, Sanımsak	250 g / 100 L Su	Bitki gelişim döneminde yaprakтан uygulanır
		2-3 Kg / dekar	
Meyveler	Elma, Armut, Kiraz, Vişne, Şeftali, Nektarin, Erik, Nar, Portakal, Mandalina, İncir, Greyfurt, Avokado, Kızılkak	200-250 g / 100 L Su	Meyve döneminde sezon boyunca yaprakтан 15-20 gün arayla uygulanır
		Ağac Başa Kökten 1-3 Yaş (30 g) 4-6 Yaş (40 g) 7-9 Yaş (50 g) 10 ve üstü (60-80 g)	Meyve döneminde sezon boyunca kökten 15-20 gün arayla uygulanır
	Muz, Üzüm, Dut, Kivi, Ahududu, Çilek, Böğürtlen	200 g / 100 L Su	Erken ilkbahar ve meyve döneminde yaprakтан uygulanır
	Tarla ve Yem Bitkileri	Buğday, Arpa, Yulaf, Tritikale, Pamuk, Fıstık, Pirinç, Nohut, Mercimek, Fasulye, Şeker Kamış, Soya, Bezelye, Fiğ, Börülce, Barbunya, Kavun, Karpuz, Mısır, Yonca, Korunga	200 g / dekar
			Diğer açık alan bitkileri içinse bitki gelişim döneminde yaprakтан uygulanır.
Yağlı Tohumlu Bitkiler	Zeytin, Ceviz, Fındık, Badem, Antep Fıstığı	200-250 g / 100 L Su	Meyve döneminde sezon boyunca yaprakтан 15-20 gün arayla uygulanır
		Ağac Başa Kökten 1-3 Yaş (30 g) 4-6 Yaş (40 g) 7-9 Yaş (50 g) 10 ve üstü (60-80 g)	Meyve döneminde sezon boyunca kökten 15-20 gün arayla uygulanır
	Susam, Haşhaş, Aspir, Ayçiçeği, Kanola	200 g / dekar	Erken ilkbahar ve bitki gelişim döneminde yaprakтан uygulanır
Aromatik Bitkiler	Çay, Gül, Kuşburnu, Kekik, Kimyon, Nane, Tütün, Adaçayı, Saffran, Lavanta, Isırgan, Çemen, Çörek Otu, Anason, Rezene, Defne	200 g / 100 L Su	Bitki gelişim döneminde yaprakтан uygulanır





EC FERTILIZER

FASTER 0-27-34+ME

PK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Nötral Amonyum Sitratta ve Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P_2O_5)
 Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P_2O_5)
 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)
 Suda Çözünür Bor (B)
 Suda Çözünür Molibden (Mo)
 Suda Çözünür Çinko (Zn)

W/W

% 27
 % 27
 % 34
 % 0.2
 % 0.4
 % 0.02

BİTKİ	TOPRAK UYGULAMA	UYGULAMA ŞEKLİ
SEBZELER: Domates, Biber, Hıyar, Kabak, Patlıcan, Marul, Fasulye, Karnabahar, Çilek, Lahana, Soğan vb.	200-400 g/da	Bitki Gelişim Döneminde
MEYVELER Kiraz, Elma, Armut, Şeftali, Nar, İncir, Erik, Ayva vb.	400 g/da	Çiçeklenme Öncesinde
NARENCİYE Portakal, Mandalina, Limon, Greyfurt vb.	400 g/da	Çiçeklenme Öncesinde ve Çiçek Tutum Zamanı
BAĞ, ANTEP FISTIĞI, YER FISTIĞI, ZEYTİN	400 g/da	Çiçeklenme Öncesi





EC FERTILIZER

MUUSADOR 39-0-5 (2 CaO)+ME

NK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)	% 39
Bi Üresi Düşük Üre (N-NH ₂)	% 37,6
Nitrat Azotu (N-NO ₃)	% 1,4
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 5
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	% 2
Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır	% 0,02
Suda Çözünür Demir (Fe) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır	% 0,02
Suda Çözünür Mangan (Mn) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır	% 0,02
Suda Çözünür Bakır (Cu) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır	% 0,02
Suda Çözünür Bor (B)	% 0,02
Suda Çözünür Molibden (Mo)	% 0,005
Klor (Cl) Beyanı	% 2,8
Bakır (Cu), Demir (Fe), Mangan (Mn) Çinko (Zn)	
EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı	2 - 11

BİTKİ	DAMLAMA UYGULAMA (DEKAR)	YAPRAK UYGULAMA (100 L)	UYGULAMA ŞEKLİ
Örtü altı bitkileri	1,5 - 2 kg	150-200 gr	Erken ilkbaharda vejetasyon döneminde damlamadan veya yapraktan uygulanır.
Açık alan bitkileri	1,5 - 2 kg	150-200 gr	Erken ilkbaharda vejetasyon döneminde damlamadan veya yapraktan uygulanır.
Yumrulu bitkiler	1,5 - 2 kg	150-200 gr	Erken ilkbaharda vejetasyon döneminde damlamadan veya yapraktan uygulanır.
Narenciye	1,5 - 2 kg	150-200 gr	Baharda sürgün gelişimi %40 ve %70 iken 2 uygulama yapılır.
Sert çekirdekli meyveler	1,5 - 2 kg	150-200 gr	Erken ilkbaharda vejetasyon döneminde damlamadan veya yapraktan uygulanır.
Yumuşak çekirdekli meyveler	2 - 2,5 kg	200-250 gr	Erken ilkbaharda vejetasyon döneminde damlamadan veya yapraktan uygulanır.
Hububat	---	250-300 gr	Bitkiyi tam örtecek şekilde uygulanır. Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemlerinde 1-2 hafta arayla uygulanır.
Pamuk	1,5 kg/da	250-300 gr	Bitkiyi tam örtecek şekilde uygulayınız. Çiçeklenmeye kadar 1-2 hafta arayla uygulanır.





EC FERTILIZER

POLYPHOSKA-P 9-45-8+(2 MgO)+ME

NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)

w/w

% 9

Amonyum Azotu (N-NH₄)

% 9

Nötral Amonyum Sitrata ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P₂O₅)

% 45

Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P₂O₅)

% 45

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)

% 8

Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)

% 2

Suda Çözünür Bor (B)

% 0,02

Suda Çözünür Bakır (Cu) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır

% 0,01

Suda Çözünür Demir (Fe) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır

% 0,1

Suda Çözünür Mangan (Mn) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır

% 0,06

Suda Çözünür Molibden (Mo)

% 0.01

Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır

% 0,01

EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı (Cu,Fe,Mn,Zn)

2 - 11

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	KULLANIM DOZU
Sera ve Açık Tarla Sebzeleri (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Çilek, Barmya, Fasulye, Bezelye, Havuç vd.), Bağ, Tütün, Fındık, Soğan, Sarımsak, Lahana (Lahanagiller), Kereviz, Turp, Brokoli, Karnabahar, Yeşil Sebzeler, Ispanak, Marul, Maydanoz vd., Bahçe Kullanımı ve Kesme Çiçekler	Sebzelerde fide dikim sonrasında, diğer tüm bitkilerde vejetatif dönem başlangıcından itibaren uygulamaya başlanır. 10-15 gün ara ile tekrarlanır.	Yapraktan, 250 gr/100 lt suya
		Topraktan 1,5 – 2,5 kg /da
Narenciye, Elma, Kiraz, Şeftali, Muz, Erik, Ceviz, Kayısı, Fıstık, Vişne, Ayıwa, Nar, Armut, Badem, Nektarin, Zeytin vd.	Tüm bitkilerde vejetatif gelişim döneminden, çiçeklenmeye kadar uygulanır. 10-15 gün ara ile tekrarlanır.	Yapraktan, 250-300 gr/100 lt suya
		Topraktan 1,5 – 2,5 kg /da
Tahıllar, Yem Bitkileri, Endüstri Bitkileri, Buğday, Arpa, Yulaf, Ayçiçeği, Mısır, Patates, Çeltik, Soya, Yer Fıstığı, Pamuk, Pancar, Nohut, Fasulye, Bezelye, vd.	Vejetatif gelişimin başlangıcından itibaren uygulanmaya başlanır. Hasada kadar 10-15 gün ara ile tekrarlanır	Yapraktan, 250 gr/100 lt suya





EC FERTILIZER

BORİMOL PK 0-13-13+ME

PK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Nötral Amonyum Sitrata ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P_2O_5)
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P_2O_5)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)
Suda Çözünür Bor (B)
Suda Çözünür Molibden (Mo)

W/W

% 13
% 13
% 13
% 8
% 10

BİTKİ	UYGULAMA ŞEKLİ	MİKTARI	KULLANIM DOZU
Sera ve Açık Alan Sebzeleri	Yapraktan	100-150 g / 100 L su	Bitki gelişim dönemi boyunca 10-12 gün ara ile 4-6 uygulama
	Topraktan	250-300 g/da	
Meyve Ağaçları, Narenciye, Bağ	Yapraktan	100-150 g / 100 L su	Bitki gelişim dönemi boyunca 2-3 uygulama
	Topraktan	200-300 g/da	
Patates	Yapraktan	100-150 g / 100 L su	Bitki gelişim dönemi boyunca 4-6 uygulama
	Topraktan	200-300 g/da	
Çilek	Yapraktan	100-150 g / 100 L su	Bitki gelişim dönemi boyunca 10-12 gün ara ile 4-6 uygulama
	Topraktan	200-300 g/da	
Tarla Bitkileri	Yapraktan	100-150 g / 100 L su	Bitki gelişim dönemi boyunca 1-2 uygulama
	Topraktan		
Muz	Yapraktan	200-300 g/da	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 2-3 uygulama
	Topraktan		





EC FERTILIZER

FOLYFERT 16,5-5-0+(4 MgO)+ME

NP GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	W/W
Toplam Azot (N)	% 16,5
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	% 6
Nitrat Azotu (N-NO ₃)	% 5
Üre Azotu (N-NH ₂)	% 5,5
Nötral Amonyum sitratta ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	% 5
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	% 5
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	% 4
Suda Çözünür Mangan (Mn)	% 4
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 4
Suda Çözünür Demir (Fe)	% 4

BİTKİ	Kullanım Dozu/Yapraktan	UYGULAMA ZAMANI
Sebzelerde ve Açık Alan Endüstri Bitkilerinde	3-5 kg/ da	Vejetatif uyanmadan meyve irileşmesine kadar 2-3 uygulama
Sera Bitkilerinde	200-300 g/100 lt suya	Şaşırtma sonrasında başlayarak
Kesme Çiçekçilik	200-300 g/100 lt suya	Şaşırtma sonrasında başlayarak





EC FERTILIZER

FOLYGROW 6-10-26+(5,5 CaO)+(2,5 MgO)+ME

NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)	% 6
Nitrat Azotu (N-NO ₃)	% 6
Nötral Amonyum Sitratta ve suda Çözünür Fosfor Penta oksit (P ₂ O ₅)	% 10
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	% 10
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 26
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	% 5,5
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	% 2,5
Suda Çözünür Bor (B)	% 0,15
Suda Çözünür Tamamı EDTA ile şelatlı Kobalt (Co)	% 0,008
Suda Çözünür Tamamı EDTA ile şelatlı Bakır (Cu)	% 0,3
Suda Çözünür Tamamı EDTA ile şelatlı Mangan (Mn)	% 0,05
Suda Çözünür Tamamı EDTA ile şelatlı Çinko (Zn)	% 0,5
EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı (Co,Cu,Mn,Zn)	2 - 11

BİTKİ	Kullanım Dozu/Yapraktan	UYGULAMA ZAMANI
MEYVELER: Narenciye, Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt, Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz	100 Litre Suya 150-200 gr	Sürgün faaliyeti ile başlayıp 2 hafta ara ile 2-3 uygulama
Bağ	100 Litre Suya 150-200 gr	Meyve tutumundan önce birinci ve bundan 15 gün sonra ikinci uygulama yapılır
Çilek	100 Litre Suya 150-200 gr	Fide dikiminden itibaren 15-20 gün aralıklarla 2-3 uygulama yapılır
Muz	100 Litre Suya 150-200 gr	Çiçeklenme döneminde başlanır. 7-10 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır
SEBZELER: Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Kabak, Fasulye, Bezelye	100 Litre Suya 150-200 gr	Gelişme devresinde bitkilerin büyümesini teşvik amacıyla başlanır. Çiçeklenme döneminden itibaren 10-15 gün ara ile 3-4 uygulama yapılır
Marul, Ispanak, Lahana, Maydanoz, Karnabahar	100 Litre Suya 150-200 gr	Gelişmenin erken devrelerinden başlanır. İleri dönemde 15 gün ara ile devam edilir.
Havuç, Soğan, Sarımsak	100 Litre Suya 150-200 gr	Gelişmenin erken devrelerinde 15 gün arayla 2-3 uygulama yapılır
Fındık	100 Litre Suya 150-200 gr	Bahar döneminde başlayarak bir sezonda 2-3 uygulama yapılır
Zeytin	100 Litre Suya 150-200 gr	Yetiştirme süresi boyunca 3-4 uygulama yapılır





EC FERTILIZER

NUTRITION 12-8-21+(2 MgO)+ME

NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)	% 12
Nitrat Azotu (N-NO ₃)	% 4,4
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	% 7,6
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	% 8
Nötral Amonyum Sitratta ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit(P ₂ O ₅)	% 8
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 21
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	% 2
Suda Çözünür Bor (B)	% 0,01
Suda Çözünür Tamamı EDTA ile şelatlı Bakır (Cu)	% 0,01
Suda Çözünür Tamamı EDDHA ile şelatlı Demir (Fe)	% 0,24
Suda Çözünür Tamamı EDTA ile şelatlı Mangan (Mn)	% 0,1
Suda Çözünür Tamamı EDTA ile şelatlı Çinko (Zn)	% 0,01
Suda Çözünür Molibden (Mo)	% 0,05

BİTKİ	Kullanım Dozu	UYGULAMA ZAMANI
Meyve Ağaçlarında	Topraktan 2,5-3 kg/ da Yapraktan 250 g / 100 L su	Meyve büyümesinde her 7-10 günde 3-4 uygulama
Sofralık ve Şaraplık Üzümde	Topraktan 2,5-3 kg/ da Yapraktan 250 g / 100 L su	Meyve tutumundan ben düşmesine kadar her 7-10 günde 3-4 uygulama
Sebze ve Endüstri Bitkilerinde	Topraktan 2,5 kg/ da Yapraktan 250 g / 100 L su	Meyve büyümesinde her 7-10 günde 3-4 uygulama
Sera Bitkilerinde	200-250 g/100 lt suya	Sebzelerde meyve büyümesinde, yapraklı sebzelerde ve kesme çiçeklerde yetiştiricilik dönemi sonunda her 7-10 günde 2-3 uygulama



NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

Toplam Azot (N)	% 19
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	% 6
Nitrat Azotu (N-NO ₃)	% 1,7
Üre Azotu (N-NH ₂)	% 11,3
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	% 34
Nötral Amonyum Sitratta ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	% 34
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 6

BİTKİ	KULLANIM DOZU	UYGULAMA ZAMANI
Kabak	Yapraktan, 100-150gr / 100 lt suya	Çiçeklenme başlangıcından itibaren her 5-7 günde bir
Domates	Yapraktan, 150-200gr /100 lt suya	Çiçeklenmede her 8-10 günde 2-3 kez tekrarlayın
Ispanak	1,5-2,5 kg/ da	Tüm yetiştiricilik dönemi boyunca 15-20 günde en az 2 uygulama
Çilek	Yapraktan, 100-150gr /100 lt suya	Çilekler görüldüğünde ve Meyve tutumu sonrası
Elma, Armut	1,5-2,5 kg/ da	Çiçeklenme başlangıcında (%20-30 çiçek açtığında) Taç yapraklar döküldüğünde
Kesme çiçekçilikte	Yapraktan, 150-200gr /100 lt suya	Çiçekler ortaya çıktıktan sonra 10-20 gün aralıklarla 2-4 uygulama



**CANDEM
GÜBRE
A.Ş.**



**KİMYEVİ
GÜBRELER**



EC FERTILIZER

CAL-FOMiX 6-30-5+(10 CaO)+ME

NPK GÜBRE SÜSPANSİYONU

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)
Nitrat Azotu (N-NO₃)
Nötral Amonyum Sitrata ve Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P₂O₅)
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P₂O₅)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)
Suda Çözünür Bor (B)
Suda Çözünür Molibden (Mo)
Klor (Cl) Beyanı

W/W

% 6
% 6
% 30
% 30
% 5
% 10
% 0.5
% 1
% 0.1

BİTKİLER	DAMLAMA UYGULAMA (DEKAR)	UYGULAMA ZAMANI
Tahıl giller	0,75 - 1 kg	Kardeşlenme döneminden başaklanma öncesi döneme kadar tek uygulama yapılabilir.
Pamuk	0,75 - 1 kg	Çiçeklenme başlangıcında uygulanır.
Mısır, Ayçiçeği, Şekerpancarı	0,75 - 1 kg	4-6 yapraklı dönemde uygulayınız. Aşırı noksanlıklarda 10-14 gün arayla tekrar uygulamalar yapmak gerekir.
Fasulye	1 kg	10-15 cm olduğu dönemde uygulayınız. Aşırı noksanlıklarda 10-14 gün arayla tekrar uygulamalar yapmak gerekir.
Patates, Havuç, Turp, Soğan, Sarımsak	0,75 - 1 kg	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 2 uygulama olarak uygulanır. Gerekliğinde 10-14 gün aralıklarla tekrar uygulama yapılabilir.
Soya, Fasulye	0,75 - 1 kg	Bitki 5-15 cm boyunda iken uygulayınız. Gerekliğinde 10-14 gün aralıklarla tekrar uygulamalar yapılabilir.
Sert Çekirdekli ler	1 kg	Meyve gözleri kabarmaya başladığı dönemde ve hasat sonrası dönemde uygulama yapılır.
Yumuşak Çekirdekli ler	1 kg	Çiçeklenme öncesi döneminde ve hasat sonrası döneminde uygulama yapılır.
Üzüm	1 kg	Çiçeklenme öncesi ve sonrası bir ay ara ile iki defa uygulanır.
Domates, Biber, Patlıcan	1 kg	Çiçeklenme öncesi ve sonrası bir ay ara ile iki defa uygulanır.





EC FERTILIZER

FEED BALANCE 5-15-0+ME

NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ


GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)
Üre Azotu (N-NH₂)
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P₂O₅)
Suda Çözünür Çinko (Zn)

W/W

% 5
% 5
% 15
% 2

BİTKİ	TOPRAK UYGULAMA	UYGULAMA ŞEKLİ
Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik	250 – 500 g / da	Kardeşlenme döneminde yapraktan
Şeker Pancarı, Patates, Havuç	250 – 500 g / da	Birinci, İkinci, Üçüncü çapadan sonra yapraktan
Üzüm, Elma, Armut, Erik, Vişne, Kiraz, Şeftali, Nektarin, Muz, Ayva, Kivi, Badem, Ceviz	100 – 250 g / 100 L Su	Erken ilkbaharda yapraklı dönemde
Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt	100 – 250 g / 100 L Su	İlkbahar ve Sonbahar döneminde
DİĞER BİTKİLER (Domates, Biber, Patlıcan, Kabak, Salatalık, Fasulye, Bezelye, Marul, Maydanoz, Roka, Tere, Çilek)	100 – 250 g / 100 L Su	Erken ilkbahar döneminde yapraktan





EC FERTILIZER

NPZN PLUS 5-25-0+ME

NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)
Amonyum Azotu (N-NH₄)
Nitrat Azotu (N-NO₃)
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P₂O₅)
Suda Çözünür Çinko (Zn)

w/w

% 5
% 1.6
% 3.4
% 25
% 5

BİTKİ	TOPRAK UYGULAMA	UYGULAMA ŞEKLİ
Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik	250 – 500 g / da	Kardeşlenme döneminde yapraktan
Şeker Pancarı, Patates, Havuç	250 – 500 g / da	Birinci, İkinci, Üçüncü çapadan sonra yapraktan
Üzüm, Elma, Armut, Erik, Vişne, Kiraz, Şeftali, Nektarın, Muz, Ayva, Kivi, Badem, Ceviz	100 – 250 g / 100 L Su	Erken ilkbaharda yapraklı dönemde
Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt	100 – 250 g / 100 L Su	İlkbahar ve Sonbahar döneminde
DİĞER BİTKİLER (Domates, Biber, Patlıcan, Kabak, Salatalık, Fasulye, Bezelye, Marul, Maydanoz, Roka, Tere, Çilek)	100 – 250 g / 100 L Su	Erken ilkbahar döneminde yapraktan



CANDEM UAN 32



EC FERTILIZER

CANDEM UAN 32

ÜRE AMONYUM NİTRAT GÜBRE ÇÖZELTİSİ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)
Amonyum Azotu (N-NH₄)
Nitrat Azotu (N-NH₃)
Üre Azotu (N-NH₂)

W/W

% 32
% 8
% 8
% 16

Bitki Adı	Uygulama Zamanı	Yapraktan (100 L su ile)	Damlama Sulamada (1 ton su ile)
Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Fasulye	Fide dikiminden itibaren, yetiştirme dönemi boyunca	250 – 300 ml / da (327,5 – 393 g / da)	3 – 4 L / da (3,93 – 5,24 kg / da)
Kabak, Karpuz, Kavun	Fide dikiminden itibaren, yetiştirme dönemi boyunca	250 – 300 ml / da (327,5 – 393 g / da)	3 – 4 L / da (3,93 – 5,24 kg / da)
İspanak, Lahana, Karnabahar, Pırasa, Marul, Maydanoz	Geliştirme dönemi boyunca	—	3 – 4 L / da (3,93 – 5,24 kg / da)
Kesme Çiçekçilik	Geliştirme dönemi boyunca	300 – 400 ml / da (393 – 524 g / da)	3 – 4 L / da (3,93 – 5,24 kg / da)
Çilek, Muz	Fide dikiminden itibaren, yetiştirme dönemi boyunca	250 – 300 ml / da (327,5 – 393 g / da)	3 – 4 L / da (3,93 – 5,24 kg / da)
Patates, Şekerpancarı, Soğan, Sarımsak ve Turp	Çıkıştan itibaren	300 – 350 ml / da (393 – 458,5 g / da)	3 – 4 L / da (3,93 – 5,24 kg / da)
Narenciye, Elma, Armut, Şeftali, Ayva, Erik, Kiraz, Nektarin, Kayısı, Nar vb.	1. Uygulama çiçeklenmeden önce 2. Uygulama meyve tutumundan sonra 3. ve 4. Uygulama meyveler olgunlaşmaya kadar	250 – 300 ml / da (327,5 – 393 g / da)	3 – 4 L / da (3,93 – 5,24 kg / da)
Bağ, Kivi	1. Uygulama çiçeklenmeden önce 2. Uygulama meyve tutumundan sonra 3. Uygulama 2. Uygulamadan 10-15 gün sonra	250 – 300 ml / da (327,5 – 393 g / da)	3 – 4 L / da (3,93 – 5,24 kg / da)
Mısır, Ayçiçeği	Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden itibaren	—	3 – 4 L / da (3,93 – 5,24 kg / da)
Soğan, Sarımsak	Geliştirme dönemi boyunca	250 – 300 ml / da (327,5 – 393 g / da)	3 – 4 L / da (3,93 – 5,24 kg / da)
Pamuk	Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden itibaren	250 – 300 ml / da (327,5 – 393 g / da)	3 – 4 L / da (3,93 – 5,24 kg / da)
Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı	Erken geliştirme döneminde	250 – 300 ml / da (327,5 – 393 g / da)	3 – 4 L / da (3,93 – 5,24 kg / da)
Buğday, Arpa, Çeltik	Kardeşlenme başlangıcından itibaren	—	0,2-0,5 l/da (0,26 – 0,65 kg/da)





EC FERTILIZER

WENTUS

AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)
 Amonyum Azotu (N-NH₄)
 Nitrat Azotu (N-NO₃)

W/W

% 18
 % 9
 % 9

BİTKİLER	UYGULAMA ZAMANI	Damlama Sulama ile Uygulama (100 L su ile)	Yapraktan Uygulama (100 L Suya)
Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Fasulye	Şaşırtmadan 15 gün sonra başlayıp 20 gün aralıklarla hasat sonuna kadar	Her uygulamada sulama suyuna 1-2 L (1,19-2,38 kg) / da karıştırılır.	200 – 250 ml (238 – 297,5 g)
Kabak, Karpuz, Kavun	Kol alımında, meyve tutumunda, daha sonra 20 gün aralıklarla	Her uygulamada sulama suyuna 1-2 L (1,19-2,38 kg) / da karıştırılır.	200 – 250 ml (238 – 297,5 g)
İspanak, Lahana, Karnabahar, Pırasa, Marul, Maydanoz	Bitkiler 3-4 yapraklı duruma geldikten sonra 20 gün aralıklarla	Her uygulamada sulama suyuna 1-2 L (1,19-2,38 kg) / da karıştırılır.	200 – 250 ml (238 – 297,5 g)
Kesme Çiçekçilik	Çiçeklenme öncesi 20 günde bir defa	Her uygulamada sulama suyuna 2 L (2,38 kg) / da karıştırılır.	200 – 250 ml (238 – 297,5 g)
Çilek	Gelişme döneminde 20 gün ara ile	Her uygulamada sulama suyuna 1-2 L (1,19-2,38 kg) / da karıştırılır.	200 – 250 ml (238 – 297,5 g)
Patates, Şekerpancarı, Soğan, Sarımsak ve Turp	Bitkiler 3-4 yapraklı duruma geldikten sonra 20 gün aralıklarla	Her uygulamada sulama suyuna 1-2 L (1,19-2,38 kg) / da karıştırılır.	200 – 250 ml (238 – 297,5 g)
Narenciye, Elma, Kivi, Armut, Şeftali, Ayva, Erik, Kiraz, Nektarin, Kayısı, Muz, Nar vb.	Şubat – Mart ayında birinci uygulama, meyve tutumundan sonra ikinci uygulama	Her uygulamada sulama suyuna 1 L (1,19 kg) / da karıştırılır.	200 – 250 ml (238 – 297,5 g)
Bağ	Gelişme döneminde 20 gün ara ile	Her uygulamada sulama suyuna 1-2 L (1,19-2,38 kg) / da karıştırılır.	150 – 200 ml (178,5 – 238 g)
Mısır	Her sulamada, sulama suyunda	Her uygulamada sulama suyuna 2 L (2,38 kg) / da karıştırılır.	300 – 350 ml (357 – 416,5 g)
Tütün, Ayçiçeği	Her sulamada, sulama suyunda	Her uygulamada sulama suyuna 2 L (2,38 kg) / da karıştırılır.	300 – 350 ml (357 – 416,5 g)
Pamuk	Vejetasyon başında, koza oluşumundan önce, 20 gün sonra üçüncü uygulama	Her uygulamada sulama suyuna 2 L (2,38 kg) / da karıştırılır.	300 – 350 ml (357 – 416,5 g)
Yeşil alanlar	İlk baharda yapılan ilk biçimden sonra	İki ayda bir olmak üzere her uygulamadan sulama suyuna 1,5 L (1,785 kg) / da	200 – 250 ml (238 – 297,5 g)
Buğday, Arpa, Çeltik	Sapa kalkma döneminde	-----	300 – 350 ml (357 – 416,5 g)



K-33 (3-0-33)



EC FERTILIZER

K-33 (3-0-33)

NK GÜBRE ÇÖZELTİSİ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)
Üre Azotu (N-NH₂)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
Klor (Cl) Beyanı

W/W

% 3
% 3
% 33
% 0.1

BİTKİ	DAMLAMA UYGULAMA (DEKAR)	YAPRAK UYGULAMA (100 L)	UYGULAMA ŞEKLİ
Örtü altı bitkileri	1 kg	100 gr	Meyve nohut büyüklüğüne eriştikten sonra hasat büyüklüğüne gelinceye kadar 2-3 uygulama yapılır.
Açık alan bitkileri	1 kg	100 gr	Meyve nohut büyüklüğüne eriştikten sonra hasat büyüklüğüne gelinceye kadar 2-3 uygulama yapılır.
Yumru bitkiler	1 kg	100 gr	Yumru hasat büyüklüğüne gelmeden 2 ay önce 30'er gün ara ile 2 uygulama yapılır.
Narenciye	1 kg	100 gr	Meyve nohut büyüklüğüne eriştikten sonra hasat büyüklüğüne gelinceye kadar 2-3 uygulama yapılır.
Sert çekirdekli meyveler	1 kg	100 gr	Meyve nohut büyüklüğüne eriştikten sonra hasat büyüklüğüne gelinceye kadar 2-3 uygulama yapılır.
Yumuşak çekirdekli meyveler	1 kg	100 gr	Meyve nohut büyüklüğüne eriştikten sonra hasat büyüklüğüne gelinceye kadar 2-3 uygulama yapılır.
Pamuk	1 kg	100 gr	Pamuk hasat büyüklüğüne gelmeden 1 ay önce 15'er gün ara ile 2 uygulama yapılır.



POTASSIUM FORCE



EC FERTILIZER

POTASSIUM FORCE

POTASYUM ÇÖZELTİSİ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)

W/W

% 30

BİTKİ	TOPRAK UYGULAMA	UYGULAMA ŞEKLİ
Üzüm, Elma, Armut, Erik, Vişne, Kiraz, Seftali, Nektarin, Muz, Ayva, Kivi, Badem, Ceviz	100-250 g/100 L su	Erken ilkbaharda yapraklı dönemde
Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt	100-250 g/100 L su	İlkbahar ve sonbahar döneminde
DİĞER BİTKİLER (Domates, Biber, Patlıcan, Kabak, Salatalık, Fasulye, Bezelye, Marul, Maydanoz, Roka, Tere, Çilek)	100-250 g/100 L su	Erken ilkbahar döneminde yapraklıktan





EC FERTILIZER

SANDiAGO

AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)

Amonyum Azotu (N-NH₄)

Üre Azotu (N-NH₂)

w/w

% 18

% 3

% 15

BİTKİ	UYGULAMA ŞEKLİ	MİKTARI	UYGULAMA ZAMANI
Sebzeler	Yapraktan	0,5 – 1 L / 100 L su (0,575 – 1,15 kg / 100 L Su)	Tüm gelişim dönemlerinde ihtiyaç duyulduğunda
	Damlama Sulama ile	2 – 4 L / da (2,3 – 4,6 kg / da)	
Meyve Ağaçları,	Yapraktan	0,5 – 1 L / 100 L su (0,575 – 1,15 kg / 100 L Su)	Meyve Tutum Döneminden itibaren 1-2 uygulama
	Damlama Sulama ile	2 – 4 L / da (2,3 – 4,6 kg / da)	
Tahıllar (Buğday, Arpa, Çeltik)	Yapraktan	1 – 5 L / da (1,15 – 5,75 kg / da)	Kardeşlenmeden itibaren 1-2 Uygulama
Çiçek	Yapraktan	0,5 – 1 L / 100 L su (0,575 – 1,15 kg / 100 L Su)	Çiçeklenme Sonrası Hasat sonuna kadar 2 – 3 uygulama
	Damlama Sulama ile	2 – 4 L / da (2,3 – 4,6 kg / da)	
Endüstri Bitkileri (Şeker Pancarı, Soya, Ayçiçeği)	Yapraktan	0,5 – 1 L / da (0,575 – 1,15 kg / da)	Bitki gelişim dönemi boyunca 1-2 uygulama
Mısır	Yapraktan	1 – 1,5 L / da (1,15 – 1,725 kg / da)	5- 6 yapraklı dönemden itibaren 1-2 uygulama
Muz	Yapraktan	1 – 1,5 L / 100 L su (1,15 – 1,725 kg / 100 L Su)	Dikimden itibaren sezon boyunca 2-3 uygulama
	Damlama Sulama ile	2 – 4 L / da (2,3 – 4,6 kg / da)	



CANDEM
GÜBRE
A.Ş.



ORGANİK
GÜBRELER



ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER

CROPLINE

KATI DENİZ YOSUNU

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
Alginik Asit
Maksimum EC (ds/m)
pH Aralığı

W/W

% 33
% 15
% 2
31,5
8 - 10

BİTKİ	KULLANIM DOZU	UYGULAMA ZAMANI
Buğday, Arpa, Mısır, Pamuk, Yulaf, Mercimek, Fiğ, Çeltik, Ayçiçeği, Tütün, Soya, Aspir	25 - 50 kg/da	Erken ilkbaharda topraktan
Üzüm, Elma, Armut, Erik, Kiraz, Vişne, Kayısı, Zeytin, Şeftali, Nektarin, Muz, Ayva, Kivi, Badem, Ceviz ve Nar	25 - 50 kg/da	Erken ilkbaharda yapraklı dönemde topraktan
Domates, Biber, Patlıcan, Kabak, Salatalık, Fasulye, Bezelye, Marul, Maydanoz, Roka, Tere, Çilek	25 - 50 kg/da	Erken ilkbaharda döneminde topraktan
Pancar, Şalgam, Patates, Havuç, Yer Elması, Soğan, Sarımsak, Yerkıstığı	25 - 50 kg/da	Erken ilkbaharda döneminde topraktan





ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER

SEAFERS

SIVI DENİZ YOSUNU


GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
Alginik Asit
Giberallik Asit (ppm)
Maksimum EC (ds/m)
pH Aralığı

W/W

% 15
% 5
% 0,2
1,3 ppm
1,08
8 - 10

BİTKİ	KULLANIM DOZU	UYGULAMA ŞEKLİ
Bütün Tahıllar	100 - 250 gr/da	Erken ilkbahar döneminde yapraktan
Domates, Hıyar, Biber, Patlıcan, Kabak, Fasulye, Bezelye, Çilek, Barbunya, Börülce, Bamyas	100 - 250 gr/da 500 - 1000 gr/da	Erken ilkbahar döneminde yapraktan Damlama sulama ile
Şeker Pancarı, Patates, Havuç, Soğan, Sarımsak	100 - 250 gr/da	Erken ilkbahar döneminde yapraktan
Bütün Meyve Ağaçları	100 - 250 gr/da	Erken ilkbahar döneminde yapraktan
Yonca, Korunca, Fiğ, Tere, Roka, Ispanak, Maydanoz, Lahana, Semizotu	100 - 250 gr/da	Bitki gelişim döneminde yapraktan
Toprakdan Uygulama	1,5 - 2 kg/da	Ekim öncesi





ORGANİK ÜRÜNLER

AMINOMAX

BİTKİSEL MENŞELİ AMİNOASİT İÇEREN
KATI ORGANİK GÜBRE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde	% 55
Organik Karbon (C)	% 17
Organik Azot (N)	% 5
Serbest Aminoasit	% 30
Maksimum Nem	% 20
pH Aralığı	3 - 5

BİTKİ	KULLANIM DOZU	UYGULAMA ŞEKLİ
Endüstri Bitkileri (Şekerpancarı, Ayçiçeği, Pamuk, Mısır)	40 – 60 g / da	1- Bitki 3-5 yapraklı dönemde iken 2-20gün sonra
Tarla Bitkileri (Baklagiller, Patates) (Hububat, Kimyon, Kavun, Karpuz, Çilek)	40 – 60 g / da	1 – Çiçeklenmeden önce 2 – 20 gün sonra
Meyveler (Elma, Armut, Erik, Kiraz, Şeftali, Kayısı, Zeytin, Ceviz, Üzüm, Muz, Kivi)	40 g / da 50 g / da 60 g / da	1 – Çiçeklenme döneminde 2 – Meyve oluşumunda 3 – 20 gün sonra
Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Soğan, Havuç, Maydanoz ve Yeşilliklerde)	40 g / da 50 g / da 60 g / da	1 – Bitki 3-5 yapraklı dönemde 2 – 20 gün sonra 3 – Sebze oluşumunda



AMİNOFERS



ORGANİK ÜRÜNLER

AMİNOFERS

BİTKİSEL MENŞELİ AMİNO ASİT
İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde
Organik Karbon (C)
Organik Azot (N)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
Serbest Amino Asitler
pH Aralığı

W/W

% 20
% 9
% 3
% 3
% 14
3-5

BİTKİ	KULLANIM DOZU	UYGULAMA ŞEKLİ
Bütün Tahıllar	100 - 250 gr/da	Erken ilkbahar döneminde yapraktan
Domates, Hıyar, Biber, Patlıcan, Kabak, Fasulye, Bezelye, Çilek, Barbunya, Börülce, Bamyas	100 - 250 gr/da 500 - 1000 gr/da	Erken ilkbahar döneminde yapraktan Damlatma sulama ile
Şeker Pancarı, Patates, Havuç, Soğan, Sarımsak	100 - 250 gr/da	1., 2. ve 3. Çapadan sonra yapraktan
Bütün Meyve Ağaçları	500 - 1000 gr/1000 L su	Erken ilkbahar döneminde yapraktan
Yonca, Korunca, Fiğ, Tere, Roka, Ispanak, Maydanoz, Lahana, Semizotu	100 - 250 gr/da	Bitki gelişim döneminde yapraktan
Topraktan Uygulama	500 - 1000 gr/da	Ekim öncesi



AMINOBIÖN



ORGANİK ÜRÜNLER

AMINOBIÖN

HAYVANSAL MENŞELİ AMİNO ASİT
İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Organik Madde
Organik Karbon (C)
Organik Azot (N)
Serbest Aminoasitler
pH Aralığı

W/W

% 57
% 25
% 8
% 9
6-8

BİTKİ	TOPRAKTAN UYGULAMA	TOPRAKTAN UYGULAMA ŞEKLİ	YAPRAKTAN UYGULAMA	YAPRAKTAN UYGULAMA ŞEKLİ
SEBZELERDE	500 - 600 cc / da	Yetiştirme döneminde 20 günde 1 defa	200 - 300 cc / 100 Lt	Yetiştirme döneminde 20 günde bir 4 uygulama
MEYVELERDE	750 - 1000 cc / da	Bitki gelişim dönemi boyunca 3-4 uygulama	200 - 300 cc / 100 Lt	Yetiştirme döneminde 15-20 günde bir 3 uygulama
TAHİL, Ş.PANCARI, PATATES	Çıkış Öncesi Toprakta 400 - 800 cc / da	Bitki gelişim dönemi boyunca sulama sistemleri ile 3 kez 200-250 cc/100 Litre su	200 - 250 cc / 100 Lt	Yetiştirme döneminde 15-20 günde bir 3 uygulama





ORGANİK ÜRÜNLER

BİGBANG

BİTKİSEL MENŞELİ AMİNO ASİT
İÇEREN KATI ORGANİK GÜBRE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde
Organik Karbon
Organik Azot (N)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
Serbest Aminoasitler
Alginik Asit
Giberallik Asit
Maksimum Nem
pH Aralığı

W/W

% 70
% 26
% 8
% 2
% 15
% 5
100 ppm
% 20
5 – 7

	UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIMI
Yapraktan Uygulama	- Sprey tankını yarisına kadar su ile doldurup karıştırıcıyı çalıştırın. - Gerekli oranda ki BIGBANG' i tanka koyun ve tankı su ile tamamlayın. - BIGBANG' i 200 – 600 L Su / Ha şeklinde uygulayınız. 2000 L / Ha uygulama dozunu aşmayınız. - Detaylı kullanım bilgileri için bayinize danışınız.
Sebzeler:	Sera Bitkileri: Fide dikiminden sonra 20 g / da 4 hafta arayla 10 g / da 3 uygulama Marul: Fide dikiminden sonra 10 g / da büyümenin % 25' i tamamlandıktan sonra 10 g / da Lahana: Fide dikiminden sonra 10 g / da 6 hafta sonra 10 g / da Karpuz, Kavun, Kabak: Dikimden sonra 10 g / da çiçekten önce 10 g / da Havuç, Soğan: 2 – 4 yaprakta 20 g / da büyümenin % 25' inde 10 g / da
Meyve Ağaçları:	İlk yaprakların oluşmasıyla birlikte 50 g / Ha, 4 hafta arayla 50 g / Ha 3 uygulama
Tarla Bitkileri:	Mısır: 3 – 5 yaprakta 40 g / Ha Tahıl: 3 – 5 yaprakta 80 g / Ha Soya, Yerfıstığı, Fasulye, Ayçiçeği ve Pamuk: 3 – 5 yaprakta 100 g / Ha Patates: 3 – 4 yaprakta 100 g / Ha, Çiçeklenmeden bir hafta önce 100 g / Ha, çiçeklenmeden 3 hafta sonra 100 g / H





ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER

FULVİCAN

FULVİK ASİT

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde
Toplam (Humik+Fulvik) Asit
Fulvik Asit
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
Maksimum Nem
pH Aralığı

W/W

% 81
% 78
% 77
% 0.3
% 20
5-7

BİTKİ	DAMLAMA SULAMA İLE	YAPRAKTAN	UYGULAMA ŞEKLİ
Tüm Sera Sebzeciliği (Domates, Biber, Kavun, Karpuz, Havuç, Patates vs.)	150 - 175 gr/da	75 - 100 gr/100 L su	Dikimden itibaren hasat sonuna kadar 15-20 ara ile 2-3 tekrerrde uygulanır.
Tüm Açık Alan Sebzeciliği (Biber, Domates, Patlıcan, Salatalık, Fasulye, Soğan, Havuç, Patates vs.)	175 - 200 gr/da	100 - 125 gr/100 L su	Dikimden itibaren hasat sonuna kadar 15-20 ara ile 2-3 tekrerrde uygulanır.
Tüm Meyve Ağaçlarında, (Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Ayva, Kiraz, Vişne, Badem, Bağ, Zeytin, Narenciye vs.)	250 - 300 gr/da veya ağaç başında 15-25 gr	125 - 150 gr/100 L su	3 uygulama tavsiye edilmektedir. 1. Tomurcuk ve çiçeklenmenin hemen öncesinde 2. meyve oluşumunda 3. hasat sonuna kadar
Tüm Endüstri Bitkileri (Mısır, Soya, Tütün, Pamuk, Ayçiçeği, Şekerpancarı vs.)	250 - 300 gr/da	125 - 150 gr/100 L su	Bitkiler 10-15 boya ulaştıktan sonra 20 gün ara ile 2-3 tekrerrde uygulanır
Tüm Tarla Bitkileri (Arpa, Buğday, Nohut, Mercimek vs.)	-----	125 - 150 gr/100 L su	Bitkiler 10-15 boya ulaştıktan sonra 20 gün ara ile 2-3 tekrerrde uygulanır



POWER ROOT



ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER

POWER ROOT

SIVI FULVİK ASİT

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde
Toplam (Humik+Fulvik) Asit
Fulvik Asit
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
pH Aralığı

W/W

% 25
% 21
% 20
% 0.08
4-6

BİTKİ	TOPRAKTAN UYGULAMA	UYGULAMA ŞEKLİ
SEBZELER: Domates, Salatalık, Biber, Patlıcan, Fasulye, Kavun, Karpuz v.s	Şaşırtılan ürünlerde; fidelerin şaşırtılması esnasında 100 lt can suyuna 250-500 cc dozda katılarak fidelelere verilir. Seralarda damlama sulamada dekara 500-1000 cc dozda 1 ay ara ile 2-3 defa uygulanır.	Bitki 3-5 yapraklı döneme ulaştığında dekara 100 cc dozda tek başına veya yaprak gübreleri, bitki gelişim düzenleyicilerle aynı dozda katılarak kullanılır. Gerekirse 20 gün sonra aynı dozda tekrar kullanılır.
DİĞER YUMRULU BİTKİLER; Patates, Havuç, Soğan	Geniş toprak uygulamasında; toprak ekime hazırlandıktan sonra dekara 1000cc Sıravari-şerit uygulaması: Ekimi takiben dekara 250-500 cc	Bitki 20-25 cm boya ulaştığında dekara 100 cc dozda tek başına veya yaprak gübreleri, bitki gelişim düzenleyicilerle aynı dozda katılarak kullanılır. Gerekirse 20 gün sonra aynı dozda kullanılır.
TARLA BİTKİLERİ: Pamuk, Mısır, Hububat, Ayçiçeği	Toprak ekime hazırlandıktan sonra dekara 500-1000 cc Sıravari-şerit uygulaması: Ekimi takiben dekara 250-500 cc Damlama veya sulama suyuna dekara 250 cc	Bitki 20-25 cm boya ulaştığında dekara 100 cc dozda tek başına veya yaprak gübreleri, bitki gelişim düzenleyicilerle aynı dozda katılarak kullanılır. Gerekirse 20 gün sonra aynı dozda kullanılır.
MEYVE BAĞÇELERİNDE; Yumuşak ve Sert Çekirdekli, Meyve Ağaçları, Narenciye, Bağ, Zeytin, Fındık, Muz v.s	Vejetatif gelişme başlayınca 10 lt suya 25 cc karıştırılarak ağaç başına ağacın taç izdüşümüne gelecek şekilde toprağa verilir.	Yaprak gübreleri, bitki gelişim düzenleyicileri veya pestisitlerle 100 lt suya 100 cc dozunda onların uygulamaları esnasında doğrudan yaprakdan pülverize edilir.





ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER

BIO HUMAT PLUS-K

POTASYUM HUMAT

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Organik Madde
Toplam (Humik+Fulvik) Asit
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)
Maksimum Nem
pH Aralığı

w/w

% 30
% 65
% 7,5
% 20
11-13

BİTKİLER	DOZU	UYGULAMA ŞEKLİ
Tüm Tahıllar	Yapraktan: 25-50 g/100 L su Damlamadan: 100-350 g/da	Kardeşlenme döneminde
Bütün Sebzeler	Yapraktan: 25-50 g/100 L su Damlamadan: 100-350 g/da	Tarla Döneminde
Bütün Baklagiller	Yapraktan: 25-50 g/100 L su Damlamadan: 100-350 g/da	Çiçeklenme öncesi
Bütün Meyve Ağaçları	Yapraktan: 25-50 g/100 L su Damlamadan: 100-350 g/da	İlkbahar döneminde
Topraktan Uygulama	Damlamadan: 200-300 g/da	Ekim öncesi
Yeşil Alan ve Süs Bitkileri	250 g/da (Tohum yatağına veya kök bölgesine)	





ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER

HUMIFERS

(LEONARDİT MENŞELİ)
SIVI HUMİK ASİT

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde
Toplam (Humik+Fulvik) Asit
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
pH Aralığı

W/W

% 5
% 15
% 4
11-13

BİTKİLER	UYGULAMA DOZU	UYGULAMA ŞEKLİ
Tüm Tahıllar	100 - 500 g/da	Erken ilkbahar döneminde yapraktan
Bütün Sebzeler	100 - 500 g/da	Erken ilkbahar döneminde yapraktan
Bütün Baklagiller	100 - 500 g/da	Erken ilkbahar döneminde yapraktan
Bütün Meyve Ağaçları	50 - 75 G 1 ADET AĞAÇ İÇİN	Erken ilkbahar döneminde yapraktan
Topraktan Uygulama	1 kg/da	Ekim öncesi





ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER

HUMİFOL C

SIVI FULVİK ASİT

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde
Toplam (Humik+Fulvik) Asit
Fulvik Asit
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
pH Aralığı

W/W

% 25
% 24
% 23
% 0.8
3-5

BİTKİ	TOPRAK UYGULAMA	UYGULAMA ŞEKLİ
Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik, Çavdar, Triticale, Mısır, Sorgun vb.	250 – 500 ml/da	Kardeşlenme döneminde topraktan
Şeker Pancarı, Patates, Havuç, Şalgam, Yerelması, Yonca, Ayçiçeği	250 – 500 ml/da	Birinci, İkinci, Üçüncü çapadan sonra topraktan
Üzüm, Elma, Armut, Erik, Vişne, Kiraz, Şeftali, Nektarın, Muz, Ayva, Kivi, Badem, Ceviz, Peino, Avakodo, Nar vb.	1 - 2,5 L/da	Erken ilkbaharda yapraklı dönemde topraktan
Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt vb.	1 - 2,5 L/da	İlkbahar ve Sonbahar döneminde topraktan
DİĞER BİTKİLER (Domates, Biber, Patlıcan, Kabak, Salatalık, Fasulye, Bezelye, Marul, Maydanoz, Roka, Tere, Çilek, Kavun, Karpuz vb.)	250 – 500 ml/da	Erken ilkbahar döneminde topraktan





ORGANİK ÜRÜNLER

CAN PLEXBİTKİSEL MENŞELİ
SIVI ORGANİK GÜBRE**GARANTİ EDİLEN İÇERİK**

Toplam Organik Madde
 Toplam Azot (N)
 Organik Karbon (C)
 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
 pH Aralığı

W/W

% 30
 % 1
 % 13
 % 4
 3,6 - 5,6

BİTKİ	UYGULAMA DOZU	UYGULAMA ŞEKLİ
Bütün tahıllar	250-500 g/da	Kardeşlenme döneminde topraktan
Domates, Hıyar, Biber, Patlıcan, Kabak, Fasulye, Bezelye, Çilek, Barbunya, Börülce, Bamy	250-500 g/da 2000-3000 g/da	Erken ilkbahar döneminde topraktan Damlama sulama ile
Şeker pancarı, Patates, Havuç, Soğan, Sarımsak	250-500 g/da	1.,2. ve 3. Çapadan sonra topraktan
Bütün Meyve Ağaçları	50-100 g/1 adet ağaç için	Erken ilkbahar ve meyve döneminde yapraktan
Yonca, Koruga, Fiğ, Tere, Roka, Ispanak, Lahana, Maydanoz, Semizotu	250-500 g/da	Bitki gelişme döneminde yapraktan
Topraktan Uygulama	2000-3000 g/da	Ekim öncesi



CORDIALLY LIQUID



ORGANİK GÜBRE

CORDIALLY LIQUID

BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde
Organik Karbon
Toplam Azot (N)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
pH Aralığı

W/W

% 45
% 12
% 2
% 4
4,5-6,5

BİTKİ	UYGULAMA DOZU	UYGULAMA ŞEKLİ
Bütün tahıllar	250-500 g/da	Kardeşlenme döneminde topraktan
Domates, Hıyar, Biber, Patlıcan, Kabak, Fasulye, Bezelye, Çilek, Barbunya, Börülce, Bamya	250-500 g/da	Erken ilkbahar döneminde topraktan
	2000-3000 g/da	Damlama sulama ile
Şeker pancarı, Patates, Havuç, Soğan, Sarımsak	250-500 g/da	1.,2. ve 3. Çapadan sonra topraktan
Bütün Meyve Ağaçları	50-100 g/1 adet ağaç için	Erken ilkbahar ve meyve döneminde yapraktan
Yonca, Koruga, Fiğ, Tere, Roka, Ispanak, Lahana, Maydanoz, Semizotu	250-500 g/da	Bitki gelişme döneminde yapraktan
Topraktan Uygulama	2000-3000 g/da	Ekim öncesi



ORGANİK ÜRÜNLER

CORDIALLY AMINO

BITKİSEL MENŞELİ AMİNOASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde

Organik Karbon

Organik Azot

Serbest Aminoasit

pH Aralığı

w/w

% 60


% 17

% 4

% 15

5 - 7

BİTKİLER	UYGULAMA ZAMANI	TOPRAKTAN UYGULAMA	YAPRAKTAN UYGULAMA
Sebzeler:Domates, Hiyar, Biber, Patlıcan, Fasulye vb.	4-6 Uygulama. Fide dikiminden itibaren sezon boyunca	1-2 L / da	200-300 cc / 100 L
Yaprağı yenen sebzeler: Marul, Kuvırcık, Lahana, Maydanoz, Roka vb.	2-3 Uygulama, Gelişim dönemi boyunca	1-2 L / da	200-300 cc / 100 L
Meyve Ağaçları	2-4 Uygulama, sezon boyunca	0,5-2 L / da	200-300 cc / 100 L
Bağ, Kivi	2-4 Uygulama, sezon boyunca	1-2 L / da	200-300 cc / 100 L
Narenciye, Zeytin	2-4 Uygulama, sezon boyunca	1-2 L / da	200-300 cc / 100 L
Pamuk	1-2 Uygulama	0,5-1 L / da	200-300cc/ da
Hububat: Arpa, Buğday, Çeltik vb.	1-2 Uygulama, kardeşlenme döneminden itibaren, başak tane dolumuna kadar	-	200-300 cc / da
Şeker Pancarı, Havuç	1-2 Uygulama, Tohum çimlenme döneminden sonra büyüme dönemi boyunca	0,5-1 L / da	200-300 cc / da
Patates	2-4 Uygulama, Çimlenme döneminden sonra büyüme dönemi boyunca	0,5-1 L / da	200-300 cc / da
Kavun- Karpuz	4-6 Uygulama, Fide dikiminden itibaren sezon boyunca	1-2 L / da	200-300 cc / 100 L
Ayçiçeği	1-2 Uygulama, Tohum çimlenme döneminden sonra büyüme dönemi boyunca	0,5-1 L / da	200-300 cc / da
Fındık, Ceviz, Badem	2-4 Uygulama, sezon boyunca	1,5-2 L / da	200-300 cc / 100 L
Çilek	4-6 Uygulama, Şaşırtmadan itibaren sezon boyunca	1-2 L / da	200-300 cc / 100 L
Muz, Avokado, Mango	4-6 Uygulama, Gelişim dönemi boyunca	1,5-2 L / da	200-300 cc / 100 L
Mısır	1-2 Uygulama, Tohum çimlenme döneminden sonra büyüme dönemi boyunca	0,5-1 L / da	200-300 cc / da
Süs Bitkileri	4-6 Uygulama, Fide dikiminden itibaren sezon boyunca	1-2 L / da	200-300 cc / 100 L
Soğan - Sarımsak	1-2 Uygulama, gelişim dönemi boyunca	0,5-1 L / da	200-300 cc / da



**CANDEM
GÜBRE
A.Ş.**



**ORGANOMİNERAL
GÜBRELER**



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

COVERFULL

İKİNCİL VE İZELEMENT KATLI KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde
Organik Azot (N)
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)
Suda Çözünür Bor (B)
Suda Çözünür Demir (Fe)
Serbest Aminoasit
Maksimum Klor (Cl)
Maksimum Nem
pH Aralığı

W/W

% 56
% 3
% 6
% 1
% 2,5
% 15
% 0,1
% 20
4 - 6

BİTKİ ADI	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN	DAMLAMA SULAMA İLE
Sebzeler	Çiçeklenme öncesi ve sonrası 2-3 uygulama	100 g / da	250 - 400 g / da
Meyve Ağaçları		100 g / da	250 - 500 g / da
Bağ		100 g / da	250 - 500 g / da
Zeytin		100 g / da	250 - 500 g / da
Endüstri Bitkileri		100 g / da	250 - 500 g / da
Aşılı Fidelerde		100 g / da	250 - 400 g / d
Hububat Yetiştiriciliği	Kardeşlenme döneminde 2-3 uygulama	100 g / da	-----



48



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

MEGAFULL

AZOTLU KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde	% 40
Toplam Azot (N)	% 12
Organik Azot (N)	% 0,6
Nitrat Azotu (N-NO ₃)	% 1,4
Üre Azotu (N-NH ₂)	% 10
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	% 2
Serbest Aminoasitler	% 3,3
Toplam (Humik + Fulvik) Asit	% 40
Maksimum Nem	% 20
Maksimum Klor (Cl)	% 0,1
pH Aralığı	6 – 8

W/W

BİTKİ	UYGULAMA DOZU		UYGULAMA ŞEKLİ
	Damlama Sulama ile	Yapraktan	
Tüm Sera Sebzeçiliği (Domates, Biber, Kavun, Karpuz, Havuç, Patates vs.)	150 – 175 g / da	75 – 100 g / 100 L Su	Dikimden itibaren hasat sonuna kadar 15-20 gün ara ile 2-3 tekrerde uygulanır.
Tüm Açık Alan Sebzeçiliği (Biber, Domates, Patlıcan, Salatalık, Fasulye, Soğan, Havuç, Patates vs.)	175 – 200 g / da	100 – 125 g / 100 L Su	Dikimden itibaren hasat sonuna kadar 15-20 gün ara ile 2-3 tekrerde uygulanır.
Tüm Meyve Ağaçlarında (Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Ayva, Kiraz, Vişne, Badem, Bağ, Zeytin, Narenciye vs.)	250 – 300 g / da veya Ağaç başına 15 – 25 g	125 – 150 g / 100 L Su	3 uygulama tavsiye edilmektedir. 1. Tomurcuk ve çiçeklenmenin hemen öncesinde 2. Meyve oluşumunda 3. Hasat sonuna kadar
Tüm Endüstri Bitkileri (Mısır, Soya, Tütün, Pamuk, Ayçiçeği, Şekerpancarı vs.)	250 – 300 g / da	125 – 150 g / 100 L Su	Bitkiler 10-15 cm boya ulaştıktan sonra 20 gün ara ile 2-3 tekrerde uygulanır.
Tüm Tarla Bitkileri (Arpa, Buğday, Nohut, Mercimek vs.)	—	125 – 150 g / 100 L Su	Bitkiler 10-15 cm boya ulaştıktan sonra 20 gün ara ile 2-3 tekrerde uygulanır.



NPK'LI KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE

w/w

Toplam Organik Madde	% 20
Toplam Azot (N)	% 6
Üre Azotu (N-NH ₂)	% 3,3
Nitrat Azotu (N-NO ₃)	% 1,2
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	% 1,5
Toplam Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	% 18
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	% 18
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 18
Selbest Aminoasit	% 2
Alginik Asit	% 0,01
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	% 2
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	% 3
Suda Çözünür Bakır (Cu) EDTA Şelatlı	% 0,005
Suda Çözünür Demir (Fe) EDTA Şelatlı	% 0,6
Suda Çözünür Mangan (Mn) EDTA Şelatlı	% 0,1
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 0,02
Suda Çözünür Molibden (Mo)	% 0,001
Maksimum Nem	% 20
Maksimum Klor (Cl) Beyanı	% 0,5
pH Aralığı	3-5

BİTKİ	KULLANIM DOZU	UYGULAMA ŞEKLİ
Bütün Tahıllar	250-500 g/da	Kardeşlenme döneminde yapraktan
Domates, Hıyar, Biber, Patlıcan, Kabak, Fasulye, Bezelye, Çilek, Barbunya, Börülce, Bamyas	250-500 g/da	Erken ilkbahar döneminde yapraktan
	500-1500 g/da	Damlama sulama ile
Şeker Pancarı, Patates, Havuç, Soğan, Sarımsak	250-500 g/da	1.,2.,3. çapadan sonra yapraktan
Bütün Meyve Ağaçları	1500-2500 g/da	Erken ilkbahar ve meyve döneminde yapraktan
Yonca, Korunca, Fiğ, Tere, Roka, Ispanak, Maydanoz, Lahana, Semizotu	250-500 g/da	Bitki gelişim döneminde yapraktan
Toprakdan Uygulama	1500-2000 g/da	Ekim öncesi



NİTROGEN



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

NİTROGEN

NK'LI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Organik Madde
Toplam Azot (N)
Üre Azotu (N-NH₂)
Nitrat Azotu (N-NO₃)
Amonyum Azot (N-NH₄)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
Serbest Aminoasitler
Suda Çözünür Çinko (Zn)
Maksimum Klor (Cl) Beyanı
pH Aralığı

W/W

% 15
% 14,5
% 6,8
% 4,6
% 3,1
% 4
% 1
% 1,5
% 0,2
2,5-4,5

BİTKİ	KULLANIM DOZU	UYGULAMA ŞEKLİ
Bütün Tahıllar	500-700 g/da	Kardeşlenme döneminde yapraktan
Domates, Hıyar, Biber, Patlıcan, Kabak, Fasulye, Bezelye, Çilek, Barbunya, Bırcılce, Bamya	250-500 g/da 1000-3000 g/da	Erken ilkbahar döneminde yapraktan Damlama sulama ile
Şeker Pancarı, Patates, Havuç, Soğan, Sarımsak	250-500 g/da	1.,2.,3. çapadan sonra yapraktan
Bütün Meyve Ağaçları	50-100 g / 1 Adet Ağaç	Erken ilkbahar ve meyve döneminde yapraktan
Yonca, Korunca, Fiğ, Tere, Roka, Ispanak, Maydanoz, Lahana, Semizotu	400-500 g/da	Bitki gelişim döneminde yapraktan
Topraktan Uygulama	1,5-2 kg/da	Ekim öncesi





ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

QUATTRO CAL-MAG

AZOTLU SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde
Toplam Azot (N)
Organik Azot (N)
Amonyum Azotu (N-NH₄)
Nitrat Azotu (N-NO₃)
Üre Azotu (N-NH₂)
Maksimum Klor (Cl)
Serbest Aminoasitler
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)
pH Aralığı

W/W

% 10
% 8
% 1
% 0,9
% 4,4
% 1,7
% 9
% 1
% 5
% 5
5 - 7

BİTKİ	YAPRAK UYGULAMA	Damlama Sulama ve Yağmurlama Sulama ile Uygulama
Y. Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut vb.)	300-500 ml / 100 L Su Erken ilkbahardan itibaren 2-3 hafta ara ile 2 uygulama	2-3 L / da Erken ilkbahardan itibaren 2-3 hafta ara ile 2 uygulama
S. Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı vb.)	300-500 ml / 100 L Su Erken ilkbahardan itibaren 2-3 hafta ara ile 2 uygulama	2-3 L / da Erken ilkbahardan itibaren 2-3 hafta ara ile 2 uygulama
Bağlarda (Çilek, Üzüm vb.)	300-500 ml / 100 L Su Erken ilkbahardan itibaren 2-3 hafta ara ile 2 uygulama	2-3 L / da Erken ilkbahardan itibaren 2-3 hafta ara ile 2 uygulama
Açık Alan Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak vb.)	300-500 ml / da Şaşırtma döneminden itibaren 2-3 hafta ara ile 2 uygulama	2-3 L / da Şaşırtma döneminden itibaren 2-3 hafta ara ile 2 uygulama
Sera Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak vb.)	300-500 ml / 100 L Su Şaşırtma döneminden itibaren 2-3 hafta ara ile 2 uygulama	2-3 L / da Şaşırtma döneminden itibaren 2-3 hafta ara ile 2 uygulama
Narenciye, Muz ve Zeytin Ağaçları	300-500 ml / 100 L Su Erken ilkbahardan itibaren 2-3 hafta ara ile 1-2 uygulama	2-3 L / da Erken ilkbahardan itibaren 2-3 hafta ara ile 1-2 uygulama
Endüstri Bitkileri: (Ayçiçeği, Pamuk, Mısır, Şekerpancarı, Patates, Tütün, Soya, Kolza, Çay vb.)	300-500 ml / da 6-8 yapraklı erken dönemde 2-3 hafta ara ile 1-2 uygulama	2-3 L / da ilk damlama sulama döneminde 2-3 hafta ara ile 1-2 uygulama
Tahıllarda (Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik)	300-500 ml / da Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemlerinde birer uygulama	2-3 L / da Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemlerinde birer uygulama



SÜPER DENGELİ 7-7-7



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

SÜPER DENGELİ 7-7-7

NPK'LI SIVI ORGANOMİNERAL CÜBRE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde	% 15
Toplam Azot (N)	% 7
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	% 3
Organik Azot (N)	% 1
Nitrat Azotu (N-NO ₃)	% 3
Toplam Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	% 7
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	% 7
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 7
Toplam Serbest Aminoasit	% 2
Maksimum Klor (Cl)	% 9
pH Aralığı	3-5

W/W

BİTKİ	UYGULAMA DOZU	UYGULAMA ŞEKLİ
Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik	250 – 500 g / da	Kardeşlenme döneminde yapraktan
Şeker Pancarı, Patates, Havuç	250 – 500 g / da	1.2. ve 3. çapadan sonra yapraktan
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Kabak, Karpuz	2,5 - 5 Kg / da	Sezon boyunca topraktan 7-15 günde bir damlama sulama ile
Marul, Tere, Maydanoz, Roka	250 – 500 g / da	Sezon boyunca 2-3 hafta ara ile yapraktan
Meyve Ağaçları	2 - 4 Kg / 100 L su	Sezon boyunca 3-4 hafta ara ile yapraktan





ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

JULIEN

NK'LI SIVI ORGANOMİNERAL CÜBRE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde
Toplam Azot (N)
Üre Azotu (N-NH₂)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
Maksimum Klor (Cl)
pH Aralığı

W/W

% 39
% 5,5
% 5,5
% 5
% 0,1
4-6

BİTKİ	KULLANIM DOZU	UYGULAMA ALANI
Sebzeler	2 - 4 L/da	Topraktan uygulama
	200-300 ml/da	Yapraktan uygulama
Endüstri Bitkileri	2 - 4 L/da	Topraktan uygulama
	200-300 ml/da	Yapraktan uygulama
Meyveler	2 - 4 L/da	Topraktan uygulama
	200-300 ml/da	Yapraktan uygulama



**CANDEM
GÜBRE
A.Ş.**



**İKİNCİL BESİN
GÜBRELERİ**



EC FERTILIZER

TETRA CAL**GARANTİ EDİLEN İÇERİK**

Toplam Kalsiyum Oksit (CaO)

W/W**% 27**

BİTKİ	KULLANIM DOZU YAPRAKTAN	UYGULAMA ŞEKLİ
Bağ, kivi, çilek	100-150 cc / 100 lt su	Çiçeklenme öncesi 1 uygulama, meyve tutumu sonrası 15-20 gün ara ile 1-2 uygulama
Örtü altı sebzeleri	100-150 cc / 100 lt su	Sebze çeşidi ve ürün miktarına bağlı olarak, meyve gelişim döneminde 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama
Yumuşak çekirdekli meyveler	100-150 cc / 100 lt su	Çiçeklenme öncesi 1 uygulama, meyve tutumu sonrası 15-20 gün ara ile 1-2 uygulama
Sert çekirdekli meyveler	100-150 cc / 100 lt su	Çiçeklenme öncesi 1 uygulama, meyve tutumu sonrası 15-20 gün ara ile 1-2 uygulama
Turuncgiller, zeytin, muz	100-150 cc / 100 lt su	Çiçeklenme öncesi 1 uygulama, meyve tutumu sonrası 15-20 gün ara ile 1-2 uygulama
Açık alan sebzelerinde	50 -10 cc / dekar	Sebze çeşidi ve ürün miktarına bağlı olarak, meyve gelişim döneminde 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama
Lahana, karnabahar, brokoli	50 -100 cc / dekar	Dikimden sonra 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama
Buğday, arpa, kanola, çeltik vb.	50 – 100 cc / dekar	Kardeşlenme döneminde 1 uygulama, çiçeklenme öncesi 1 uygulama
Şeker pancarı, mısır, ayçiçeği, patates	50 – 100 cc / dekar	Bitkiler 4-6 yapraklı olduğu dönemden itibaren 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama
Pamuk, Soya, Yer fıstığı	50 – 100 cc / dekar	Bitkiler 4-6 yapraklı olduğu dönemden itibaren 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama

Tüm kültür bitkilerinde damlama ve yağmurlama sulama sistemleri ile 0,5 – 1 lt /dekar aralığında uygulama yapılabilir.





EC FERTILIZER

TETRA CALMAG

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Kalsiyum Oksit (CaO)

Toplam Magnezyum Oksit (MgO)

W/W

% 20

% 14

BİTKİ	KULLANIM DOZU YAPRAKTAN	UYGULAMA ŞEKLİ
Bağ, kivi, çilek	100-150 cc / 100 lt su	Çiçeklenme öncesi 1 uygulama, meyve tutumu sonrası 15-20 gün ara ile 1-2 uygulama
Örtü altı sebzeleri	100-150 cc / 100 lt su	Sebze çeşidi ve ürün miktarına bağlı olarak, meyve gelişim döneminde 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama
Yumuşak çekirdekli meyveler	100-150 cc / 100 lt su	Çiçeklenme öncesi 1 uygulama, meyve tutumu sonrası 15-20 gün ara ile 1-2 uygulama
Sert çekirdekli meyveler	100-150 cc / 100 lt su	Çiçeklenme öncesi 1 uygulama, meyve tutumu sonrası 15-20 gün ara ile 1-2 uygulama
Turuncgiller, zeytin, muz	100-150 cc / 100 lt su	Çiçeklenme öncesi 1 uygulama, meyve tutumu sonrası 15-20 gün ara ile 1-2 uygulama
Açık alan sebzelerinde	50 -10 cc / dekar	Sebze çeşidi ve ürün miktarına bağlı olarak, meyve gelişim döneminde 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama
Lahana, karnabahar, brokoli	50 -100 cc / dekar	Dikimden sonra 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama
Buğday, arpa, kanola, çeltik vb.	50 – 100 cc / dekar	Kardeşlenme döneminde 1 uygulama, çiçeklenme öncesi 1 uygulama
Şeker pancarı, mısır, ayçiçeği, patates	50 – 100 cc / dekar	Bitkiler 4-6 yapraklı olduğu dönemden itibaren 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama
Pamuk, Soya, Yer fıstığı	50 – 100 cc / dekar	Bitkiler 4-6 yapraklı olduğu dönemden itibaren 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama

Tüm kültür bitkilerinde damlama ve yağmurlama sulama sistemleri ile 0,5 – 1 lt/dekar aralığında uygulama yapılabilir.



5kg



EC FERTİLİZER

CALİNA

KALSİYUM NİTRAT ÇÖZELTİSİ
(Yapraktan Uygulama İçin)

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)
Nitrat Azotu (N-NO₃)
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)

W/W

% 9
% 9
% 14

BİTKİ	UYGULAMA DOZU	UYGULAMA ŞEKLİ
Üzüm, Elma, Armut, Erik, Vişne, Kiraz, Şeftali, Kayısı, Nektarin, Ayva, Kivi, Badem, Ceviz, Nar vb.	100-250 ml / 100 L Su (137 – 342,5 g / 100 L Su)	Erken ilkbaharda yapraklı dönemde
Buğday, Arpa, Mısır, Yulaf, Çeltik, Çavdar vb.	250 – 500 ml / da (342,5 – 685 g / da)	Kardeşlenme döneminde yapraktan
Şekerpancarı, Patates, Havuç	250 – 500 ml / da (342,5 – 685 g / da)	Birinci, ikinci, üçüncü çapadan sonra yapraktan
Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt	250 – 500 ml / 100 L Su (342,5 – 685 g / 100 L Su)	İlkbahar ve sonbahar döneminde yapraktan
DİĞER BİTKİLER Domates, Biber, Tere, Patlıcan, Kabak, Salatalık vb.	250 – 500 ml / 100 L Su (342,5 – 685 g / 100 L Su)	Erken ilkbahar döneminde yapraktan



CAL-15

EC FERTILIZER

CAL-15

KALSIYUM NİTRAT ÇÖZELTİSİ

Damlama ve yağmurlama sulama şeklinde uygulama için

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)
Nitrat Azotu (N-NO₃)
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)
Suda Çözünür Bor (B)
Suda Çözünür Bakır (Cu)
Suda Çözünür Demir (Fe)
Suda Çözünür Çinko (Zn)
Suda Çözünür Mangan (Mn)
Suda Çözünür Molibden (Mo)
Klor (Cl) Beyanı

W/W

% 9
% 9
% 15
% 0.1
% 0.02
% 0.02
% 0.02
% 0.02
% 0.005
% 0.1

BİTKİ	DAMLAMA UYGULAMA (Dekar)	YAPRAK UYGULAMA (100L)	UYGULAMA ŞEKLİ
Örtü altı bitkileri	1-2 kg	100-150 gr	Meyve gelişim dönemi ve ihtiyaç duyulan her dönemde 15 gün aralıklarla kullanılabilir.
Domates, Biber, Patlıcan	1-2 kg	100-150 gr	İkinci çiçek sürgünler görülünce uygulanır. 7-14 gün arayla tekrarlanır.
Yumuşak Çekirdekli	1-2 kg	150-200 gr	Taç yaprakların dökülmesinden hasattan 1 hafta öncesine kadar 7-14 gün arayla uygulayınız.
Sert Çekirdekli	1-2 kg	150-200 gr	Meyve tutumundan sonraki dönemde hasattan 4 hafta ve 2 hafta önce olmak üzere 2 kez uygulayınız.
Bağ	1-2 kg	150-200 gr	Dene tutumu ile hasattan 1 ay önceki zaman arasında 7-14 gün arayla uygulayınız.
Pamuk	1-2 kg	150-200 gr	Tarakanma başlangıcı ile %20 çiçeklenme arası uygulayınız. Pamukta koza dökümünü önler ve verimde artış sağlar.
Çilek	1-2 kg	100-150 gr	Çiçeklenme başlangıcında itibaren 7-10 gün arayla 3 kez uygulanır.
Kavun, Karpuz	1-2 kg	150-200 gr	Meyve teşekkülü ile hasat arasında kalan zaman içinde 7 gün arayla 2-3 kez uygulanır.
Lahana, Brokoli, Karnibahar	1-2 kg	150-200 gr	Gövde gelişmesi / Baş teşekkülü döneminden başlayarak hasata kadar 10-14 gün arayla 2-3 uygulama yapılır.
Patates, Pancar, Havuç	1-2 kg	100-150 gr	Yumurta teşekkülü başlangıcında ilk uygulama yapılır. 10-14 gün arayla 2-3 kez tekrarlanır.
Soğan, Sarımsak	1-2 kg	150-200 gr	Çıkıştan yada şartırtmadan sonra başlanarak 10-14 gün arayla 2-3 kez uygulanır.
Narenciye	1-2 kg	150-200 gr	Meyvenin büyümeye başladığı dönem ile hasat arasında 10-14 gün arayla 3 kez uygulanır.
Hububat	-----	150-200 gr	Kardeşlenme ile sapa kalkma dönemi arasında uygulanır.



KÜKÜRT S-80



EC FERTİLİZER

KÜKÜRT S-80

ELEMENTEL SIVILAŞTIRILMIŞ KÜKÜRT
(SÜSPANSİYON KONSANTRE)

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Elementel Kükürt (S)

W/W

% 80

BİTKİ	DAMLAMA UYGULAMA	YAPRAK UYGULAMA	UYGULAMA ŞEKLİ
ÖRTÜ ALTİ BİTKİLERİ (Domates, Biber, Kabak, Salatalık)	2 lt/da	150 cc/100L	Bitkinin ihtiyacı olduğu tüm dönemlerde önerilen dozajlarda kullanılır.
AÇIK ALAN SEBZE BİTKİLERİ (Kavun, Karpuz, Biber, Domates, Patlıcan, Salatalık)	3 lt/da	200 cc/100L Yağmurlama 3 lt/da	Bitkinin ihtiyacı olduğu tüm dönemlerde önerilen dozajlarda kullanılır.
TAHİL, YEM, BAKLAGİL ve ENDÜSTRİ BİTKİLERİ (Buğday, Kanola, Pamuk, Fasulye, Mısır, Ayçiçeği)	3 lt/da	200 cc/100L Yağmurlama 3 lt/da	Bitkinin ihtiyacı olduğu tüm dönemlerde önerilen dozajlarda kullanılır.
YUMRULU BİTKİLER (Pancar, Havuç, Patatesi, Turp)	3 lt/da	200 cc/100L Yağmurlama 3 lt/da	Bitkinin ihtiyacı olduğu tüm dönemlerde önerilen dozajlarda kullanılır.
NARENCİYE (Portakal, Mandalina, Limon)	2 lt/da Ağaç başı 50 cc	150 cc/100L	Bitkinin ihtiyacı olduğu tüm dönemlerde önerilen dozajlarda kullanılır.
SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELER (Şeftali, Kayısı, Erik, Badem, Kiraz, Ceviz, Zeytin, Fındık)	2 lt/da Ağaç başı 50 cc	150 cc/100L	Bitkinin ihtiyacı olduğu tüm dönemlerde önerilen dozajlarda kullanılır.
YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVELER (Elma, Armut, Ayva, Üzüm)	2 lt/da Ağaç başı 50 cc	150 cc/100L	Bitkinin ihtiyacı olduğu tüm dönemlerde önerilen dozajlarda kullanılır.
YAPRAĞI YENEN YEŞİL BİTKİLER (Marul, Maydanoz, Soğan, Sarımsak)	2 lt/da	100 cc/100L	Bitkinin ihtiyacı olduğu tüm dönemlerde önerilen dozajlarda kullanılır.





EC FERTILIZER

TİYOSUL

POTASYUM TİYOSÜLFAT

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO_3)

W/W

% 25
% 42

BİTKİLER	UYGULAMA ZAMANI	Topraktan (1 ton su ile)	Yapraktan (100 L su ile)
Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar	Meyveler yeterli iriliğe ulaştıktan sonra	1-3	200-250 ml/dekar
Karpuz, Kavun, Kabak	Meyveler yeterli iriliğe ulaştıktan sonra	1-3	200-250 ml/dekar
Çilek	Meyveler yeterli iriliğe ulaştıktan sonra	1-2	150-200 ml/dekar
Bağ, Kivi	Tatlı koruk döneminde	1-3	200-250 ml/dekar
Muz	Taraklarda irileşme olunca	2-3	200-250 ml/dekar
Narenciye	Meyveler irileşip, ben düştüğünde	2-3	200-250 ml/dekar
Kiraz, Vişne, Şeftali, Kayısı, Erik	Meyveler irileşip, ben düştüğünde	1-3	150-200 ml/dekar
Elma, Armut, Ayva	Meyveler irileşip, ben düştüğünde	1-3	200-250 ml/dekar
Zeytin	Çekirdek sertleşmesinden sonra	1-3	200-250 ml/dekar
Mısır, Ayçiçeği	Danede süt doldurma döneminde	1-2	200-250 ml/dekar
Patates, Şeker Pancarı, Havuç	Yumru irileşme döneminde	2-3	200-250 ml/dekar
Buğday, Arpa, Çelik	Başakta süt dolum döneminde	-	200-250 ml/dekar
Pamuk	Koza açma döneminde	1-2	200-250 ml/dekar
Fasulye, Nohut, Mercimek	Kapsül doldurma döneminde	1-2	150-200 ml/dekar
Fındık, Ceviz, Antep fıstığı	İç doldurma döneminde	1-3	150-200 ml/dekar
Soğan, sarımsak	Baş irileşme döneminde	1-2	150-200 ml/dekar
Yaprağı yenen sebzeler (Marul, Kivırcık, Lahana)	Yetiştirme dönemi sonuna doğru	1-2	100-150 ml/dekar
Yeşil alanlar, Süs bitkileri	Yetiştirme dönemi sonuna doğru	1-3	150-200 ml/dekar



**CANDEM
GÜBRE
A.Ş.**



**İZ ELEMENTLİ
GÜBRELER**



EC FERTILIZER

TERRAMİX

BOR (B), DEMİR (Fe-SÜLFAT), MANGAN(Mn-SÜLFAT) ve ÇİNKO (Zn-SÜLFAT),
MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Bor (B)

W/W

% 1,5

Suda Çözünür Demir (Fe)

% 5

Suda Çözünür Mangan (Mn)

% 5

Suda Çözünür Çinko (Zn)

% 9

BİTKİ	KULLANIM DOZU (TOPRAKTAN)	UYGULAMA ZAMANI
Tarla ve sera bitkileri	2-3 kg/da Topraktan	Toprak hazırlığında serpme (damla sulama 1,5 kg/da)
Meyve Ağaçları	100-150 g / ağaç	Sonbahar/İlkbahar ağaç taç izdüşümüne serpme
Fındık	100-150 g / ağaç	Sonbahar/İlkbahar ağaç taç izdüşümüne serpme
Üzüm	30 g / Omca	Sonbahar/İlkbahar
Zeytin	100-200 g / ağaç	Sonbahar/İlkbahar ağaç taç izdüşümüne serpme
Narenciye	100-150 g / ağaç	Sonbahar/İlkbahar ağaç taç izdüşümüne serpme
Muz	100 g / çanak	Onarımdan sonra
Ayçiçeği, Mısır, Pamuk	2-3 kg / da topraktan	Taban gübresi ile serpme
Tahıllar	2-3 kg / da topraktan	Taban gübresi ile serpme





EC FERTILIZER

POWER FORCE BZnFe

BOR (B), DEMİR (Fe SÜLFAT), ÇİNKO (Zn SÜLFAT),
MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Bor (B)
Suda Çözünür Demir (Fe)
Suda Çözünür Çinko (Zn)
Klor (Cl) Beyanı

W/W

% 8
% 8
% 8
% 0,10

BİTKİ	UYGULAMA DOZU	UYGULAMA ŞEKLİ
Tarla ve Sera bitkileri	2-3 kg/da	Toprak hazırlığında serpme damlama sulama 1,5 kg/da
Meyve ağaçları narenciye	100-150 gr/da	Sonbahar ilkbahar ağaç taç iz düşümüne serpme
Fındık	100-150 gr/ocak	Sonbahar ilkbahar ağaç taç iz düşümüne serpme
Üzüm	30 gr/omca	Sonbahar ilkbahar
Zeytin	100-200 gr/ağaç	Sonbahar ilkbahar ağaç taç iz düşümüne serpme
Muz	100 gr/yalak	Onarımdan sonra
Ayçiçeği, Mısır, Pamuk	2-3 kg/da	Taban gübresi ile birlikte serpme
Tahıllar	2-3 kg/da	Taban gübresi ile birlikte serpme
Şekerpancarı	TABAN GÜBRESİ ile 2-3 kg/da (Topraktan) 150-250 g/da (Yapraktan)	Birinci, ikinci ve üçüncü çapadan sonra





EC FERTILIZER

BOROZİN-FE

BOR (B), DEMİR (Fe-SÜLFAT) ve ÇİNKO (Zn-SÜLFAT),
MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Bor (B)
Suda Çözünür Demir (Fe)
Suda Çözünür Çinko (Zn)

W/W

% 5
% 2
% 10

Bitki Adı	Uygulama Zamanı	Kullanım Dozu (Topraktan)
Tarla, sera, sebze	Toprak hazırlığında serpme (damla sulama 1,5 kg/da)	2-3 kg/da Topraktan
Meyve Ağaçları	Sonbahar/İlkbahar ağaç taç izdüşümüne serpme	100-150 g / ağaç
Fındık	Sonbahar/İlkbahar ağaç taç izdüşümüne serpme	100-150 g / ocak
Üzüm	Sonbahar/İlkbahar	30 g / Omca
Zeytin	Sonbahar/İlkbahar ağaç taç izdüşümüne serpme	100-200 g / ağaç
Narenciye	Sonbahar/İlkbahar ağaç taç izdüşümüne serpme	100-150 g / ağaç
Muz	Onarımdan sonra	100 g / çanak
Ayçiçeği, Mısır, Pamuk	Taban gübresi ile serpme	2-3 kg / da topraktan
Tahıllar	Taban gübresi ile serpme	2-3 kg / da topraktan
Ceviz, Antepfıstığı	Sonbahar/İlkbahar ağaç taç izdüşümüne serpme	100-150 g / ağaç
Yer fıstığı	Toprak hazırlığında serpme (damla sulama 1,5 kg/da)	2-3 kg / da
Çilek	Toprak hazırlığında serpme (damla sulama 1,5 kg/da)	2-3 kg / da
Şeker pancarı	Taban gübresi ile serpme	3-4 kg / da





EC FERTILIZER

SETUP

BOR (B) ve ÇİNKO (Zn SÜLFAT),
MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Bor (B)
Suda Çözünür Çinko (Zn)

W/W

% 5
% 10

BİTKİ	Damlama Sulama / da	Yapraktan 100 lt su veya da	UYGULAMA DÖNEMİ
Açık tarla sebzeleri, domates, biber, patlıcan, hıyar, fasulye, kavun, karpuz, vb.	500 – 600 g / da	100 – 200 g	Şaşırtmadan itibaren çiçeklenmeden boyunca 10 gün ara ile
Sera ve örtü altı sebzeleri	500 – 600 g / da	100 – 200 g	Şaşırtmadan itibaren çiçeklenmeden boyunca 10 gün ara ile
Meyve ağaçları	500 – 600 g / da	100 – 200 g	Vejetatif gelişim döneminde 1-2 hafta ara ile
Bağ	500 – 600 g / da	100 – 200 g	Aktif gelişim döneminde
Zeytin	500 – 600 g / da	100 – 200 g	Çiçeklenme öncesi ve meyve tutumu sonrası
Narenciye	500 – 600 g / da	100 – 200 g	Meyve öncesi ve meyve sonrası bölünerek 2-3 uygulama
Buğday, arpa, çeltik, ayçiçeği, mısır	500 – 600 g / da	100 – 200 g	Aktif gelişim döneminde ve başaklanma öncesi
Şeker pancarı, patates, havuç	500 – 600 g / da	100 – 200 g	İlk çapadan sonra gelişim dönemi boyunca
Çilek	500 – 600 g / da	100 – 200 g	Şaşırtmadan itibaren çiçeklenme öncesi 2-3 uygulama
Pamuk	500 – 600 g / da	100 – 200 g	Aktif gelişim süresince ve çiçeklenme öncesi
Fındık	500 – 600 g / da	100 – 200 g	Aktif gelişim dönemi boyunca 2-3 uygulama





EC FERTİLİZER

MOZİN-B

BOR (B), MOLİBDEN (Mo) VE ÇİNKO (Zn-SÜLFAT)
MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Çinko (Zn)

Suda Çözünür Molibden (Mo)

Suda Çözünür Bor (B)

W/W

% 10

% 7

% 2

BİTKİ	KULLANIM DOZU	UYGULAMA ZAMANI
Açık Alanlarda,	50-70 gr/da	Bitkilerde aktif gelişme döneminde 15 gün aralar ile 4-5 uygulama önerilir
Kiraz, Şeftali, Kayısı, Elma, Armut, Fındık, Bağ, Nar, Karpuz, Kavun, Kivi, Avokado,	50-75 gr/da	Kol atma ve çiçeklenmeden sonra, meyve bağlama öncesi ihtiyaca göre 2-3 uygulama
Zeytin	50-75 gr/da, Toprakdan 200-300 gr/da	Çiçeklenme öncesi ve sonrasında 2-4 uygulama
Muz	50-75 gr/da	Onarım döneminden sonra başlanarak 10-15 günlük aralar ile ihtiyaca göre
Şeker Pancarı	50-75 gr/da	4-5 yapraklı ve sıralar kapanınca
Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik	50-75 gr/da, Toprakdan 250-350 gr/da	Kardeşlenme ve sapa kalkma döneminde
Çilek	40-60 gr/da, Toprakdan 300-400 gr/da	Fide dikiminden sonra, çiçeklenme başlangıcında ve hasat döneminde
Süs Bitkileri, Soğan, Marul, Kereviz	40-60 gr/da, Toprakdan 200-350 gr/da	Bitki gelişim aşamasında, Meyve oluşumundan önce, yeterince yeşil aksam oluşunca ihtiyaca göre 1-3 uygulama
Narenciye, Patates	60-80 gr/da, Toprakdan 300-400 gr/da	Çiçeklenme öncesi ve sonrasında 2-3 uygulama:
Ayçiçeği, Pamuk, Mısır	60-80 gr/da, Toprakdan 250-350 gr/da	Çıkıştan takiben 10-15 gün sonra, ihtiyaca göre 1-3 uygulama
Diğer Bitkiler	40-75 gr/da	Bitkilerin aktif gelişme döneminde





EC FERTILIZER

CANDEM BORZİNK

BOR (B), ÇİNKO (Zn SÜLFAT),
MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Bor (B)
Suda çözünür Çinko (Zn)

W/W

% 1.5
% 25

BİTKİ	DOZU		UYGULAMA ŞEKLİ
Tahıllar	100 gr/dekar		Kardeşlenme döneminde yapraktan
Baklagiller	150 gr/dekar		Çiçeklenme öncesi yapraktan
Meyve Ağaçları	Yapraktan	150 gr / 100 L Su	İlkbahar ve Meyve öncesi
	TOPRAKTAN		
	1-3 Yaş	20 g	
	3-5 Yaş	30 g	
	5-10 Yaş	50 g	
	10-20 Yaş	75 g	
Sebzeler	Yapraktan	150 g / 100 L Su	Fide dikiminden itibaren
	Topraktan	200 g / dekar	





EC FERTILIZER

CANDEM TRACE MIX

BAKIR (Cu-sülfat), ÇİNKO (Zn-sülfat) ve MANGAN (Mn-sülfat),
MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Bakır
Suda Çözünür Çinko (Zn)
Suda Çözünür Mangan (Mn)

W/W

% 4
% 10
% 4

BİTKİ	KULLANIM DOZU (Damla sulama)	KULLANIM DOZU (Yapraktan)
Sebzeler	500 gr/ dekara 20-30 gün aralıklarla	100-150 gr/100 L suya
Narenciye	500 gr/ dekara 20-30 gün aralıklarla	100-150 gr/100 L suya
Yumuşak çekirdekli, sert çekirdekli meyveler	500 gr/ dekara 20-30 gün aralıklarla	100-150 gr/100 L suya
Kiraz, Çilek	500 gr/ dekara 20-30 gün aralıklarla	100-150 gr/100 L suya
Zeytin, Ceviz	500 gr/ dekara 20-30 gün aralıklarla	100-150 gr/100 L suya
Bağ	500 gr/ dekara 20-30 gün aralıklarla	100-150 gr/100 L suya
Hububat (Arpa, Buğday)	-	(1.Uygulama kardeşlenme döneminde 2. Uygulama başaklanma öncesi)
Endüstri Bitkileri (Kanola, Ayçiçeği, Pamuk, Mısır)	-	100-150 gr/100 L suya (10-14 yaprak arası)





EC FERTILIZER

SPEKSTRİN EDDHA FE % 6

DEMİR ŞELATİ - EDDHA

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Demir (Fe)
EDDHA ile Şelatlı Demir (Fe)
Şelatın Stabil Olduğu pH aralığı

W/W

% 6

% 6

7-9

BİTKİ	DAMLAMA UYGULAMA	UYGULAMA ŞEKLİ
ÖRTÜ ALTİ BİTKİLERİ (Domates, Biber, Kabak, Salatalık)	1 kg/da	Özellikle yeşil aksam safhası olmak üzere sezon boyunca 3-4 hafta arayla demir ihtiyacı görüldüğünde uygulama yapılır.
AÇIK ALAN SEBZE BİTKİLERİ (Kavun, Karpuz, Biber, Domates, Patlıcan, Salatalık)	1.5 kg/da	Özellikle yeşil aksam safhası olmak üzere sezon boyunca 3-4 hafta arayla demir ihtiyacı görüldüğünde uygulama yapılır.
TAHİL, YEM, BAKLAGİL ve ENDÜSTRİ BİTKİLERİ (Buğday, Kanola, Pamuk, Fasulye, Mısır, Ayçiçeği, Arpa, Yonca)	1.5 kg/da	Tahıllarda kardeşlenme döneminde yapraklardan 1 uygulama yapılır. Diğer bitki gruplarında ise yeşil aksam dönemlerinde uygulama yapılır.
YUMRULU BİTKİLER (Pancar, Havuç, Patatesi, Turp)	1.5 kg/da	Birinci çapada ve bu çapa üzerinden 1 ay geçtikten sonra olmak üzere 2 uygulama tavsiye edilir.
NARENCİYE (Portakal, Mandalina, Limon)	1 kg/da	Özellikle yeşil aksam safhası olmak üzere sezon boyunca 3-4 hafta arayla demir ihtiyacı görüldüğünde uygulama yapılır.
SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELER (Şeftali, Kayısı, Erik, Badem, Kiraz, Ceviz, Zeytin, Fındık)	1 kg/da	Özellikle yeşil aksam safhası olmak üzere sezon boyunca 3-4 hafta arayla demir ihtiyacı görüldüğünde uygulama yapılır.
YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVELER (Elma, Armut, Ayva, Üzüm)	1 kg/da	Özellikle yeşil aksam safhası olmak üzere sezon boyunca 3-4 hafta arayla demir ihtiyacı görüldüğünde uygulama yapılır.
YAPRAĞI YENEN YEŞİL BİTKİLER (Marul, Maydanoz, Soğan, Sarımsak)	750 gr/da	Sezon boyunca 3-4 hafta arayla demir ihtiyacı görüldüğünde uygulama yapılır.
NOT :	EDDHA şelatlı "Spekstrin" ph 10'un üzerindeki topraklarda bile bozulmadan aynı alınabilir demir formunu koruduğu için damlama ya da topraktan serpmeye önerilir. Yaprak uygulamaları arzu edildiğinde ise bütün bitkilerde 100L'ye 100 gr dozajında önerilir.	





EC FERTİLİZER

SIMOCOB

KOBALT (Co-SÜLFAT) VE MOLİBDEN (Mo)
SIVI MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Kobalt (Co)
Suda Çözünür Molibden (Mo)

W/W

% 3
% 1,5

BİTKİ ADI	KULLANIM DOZU (YAPRAKTAN)	UYGULAMA ZAMANI
Tarla Bitkileri (Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik)	100 L suya 150 – 200 ml (168-224 g)	Tüm Sezon Boyunca 2-3 kez Uygulanır
Endüstri Bitkileri (Mısır, Pamuk, Ayçiçeği, Soya)	100 L suya 150 – 200 ml (168-224 g)	Tüm Sezon Boyunca 2-3 kez Uygulanır
Açık Alan Sebzeciliği (Kavun, Karpuz, Fasulye, Enginar)	100 L suya 150 – 200 ml (168-224 g)	Tüm Sezon Boyunca 2-3 kez Uygulanır
Sera Sebzeciliği (Domates, Biber, Patlıcan)	100 L suya 150 – 200 ml (168-224 g)	Tüm Sezon Boyunca 2-3 kez Uygulanır
Meyve Ağaçları (Badem, Bağ, Antep Fıstığı, Erik, Kayısı, Şeftali, Kiraz, Elma, Muz, Zeytin ve Narenciye vb.)	100 L suya 150 – 200 ml (168-224 g)	Tüm Sezon Boyunca 2-3 kez Uygulanır





EC FERTİLİZER

ZENITH

MANGAN (Mn-SÜLFAT) VE ÇİNKO (Zn-SÜLFAT)
SIVI MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Mangan (Mn)

Suda Çözünür Çinko (Zn)

W/W

% 1,5

% 2,5

BİTKİ	KULLANIM DOZU	UYGULAMA ŞEKLİ
Açık Tarla ve Sera Bitkileri, Kavun, Karpuz, Çilek	100 – 200 ml (107 – 214 g)	Her türlü ürün grubunda köklenme döneminden hasada kadar tavsiye edilir. Özellikle buğday, mısır gibi daneli bitkilerde çinko içeriği ile verime katkı sağlaması açısından köklenme, dane oluşumu, olgunlaşma dönemlerinde 3-5 uygulama yapılması tavsiye edilir.
Meyve Ağaçları	200 – 300 ml (214 – 321 g)	
Üzüm, Muz, Nar, İncir, Narenciye, Zeytin, Çay	200 – 300 ml (214 – 321 g)	
Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı, Kestane	200 – 300 ml (214 – 321 g)	
Lahana, Turp, Havuç, Kereviz, Karalahana	200 – 300 ml (214 – 321 g)	
Soğan, Sarımsak	200 – 300 ml (214 – 321 g)	
Şekerpancarı, Patates, Çeltik	200 – 300 ml (214 – 321 g)	
Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Tahıl, Baklagiller, Yem Bitkileri	200 – 300 ml (214 – 321 g)	
Yeşil Alan, Kesme çiçekçilik	200 – 300 ml (214 – 321 g)	



BORAMİN ON



EC FERTILIZER

BORAMİN ON

BORON ETANOL AMİN

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Bor (B)

W/W

% 10

BİTKİ	UYGULAMA DOZU	UYGULAMA ŞEKLİ
Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik, Çavdar, Mısır, Pamuk vb.	250 – 500 g / da	Kardeşlenme döneminde yapraktan
Şeker Pancarı, Patates, Havuç	250 – 500 g / da	1.2. ve 3. çapadan sonra yapraktan
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Kabak	100-250 g/100 L su	Erken ilk bahar döneminde yapraktan
Marul, Tere, Maydanoz, Roka	100-250 g/100 L su	Erken ilk bahar döneminde yapraktan
Meyve Ağaçları	100-250 g/100 L su	Erken ilk bahar döneminde yapraktan
Örtü altı yetiştiriciliği	1-2 kg/da	Damlama sulama sistemi ile tercihen dekara en az 100 L su ile birlikte uygulanır



COPPER LIQUID



EC FERTILIZER

COPPER LIQUID

BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ
(Bakır Nitrat İçerikli)

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Bakır (Cu)

W/W

% 9

BİTKİ	UYGULAMA DOZU	UYGULAMA ŞEKLİ
Tüm Bitkilerde	Damlama sulama ile 400 cc/da	TOPRAKTAN
Sera Bitkilerinde	Yapraktan 50cc / 100 L su/ da	HASAT BOYUNCA
Üzüm, Elma, Armut, Erik, Kiraz, Vişne Kayısı, Zeytin, Şeftali, Nektarin, Muz, Ayva, Kiwi, Badem, Ceviz	75cc / 100 L su	ERKEN İLKBAHARDA AĞAÇLARIN GÖZLERİ UYANMADAN ÖNCE
	150cc / 100 L su	HASAT SONRASI AĞAÇLAR YAPRAKLARINI DÖKTÜKTEN SONRA
Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt, Yenidünya, Zeytin	75 cc/ 100 L su	İLKBAHAR VE SONBAHAR DÖNEMLERİNDE
Domates, Biber, Patlıcan, Kabak, Salatalık, Fasulye, Bezelye, Marul, Maydanoz, Roka, Tere, Çilek	50 cc / 100 L su/da	ERKEN İLKBAHARDA YAPRAKLI DÖNEMDE



**CANDEM
GÜBRE
A.Ş.**



**SET
GÜBRELER**



MEGA 5'Lİ SET

TOPRAK ÜSTÜ BİTKİ GRUBU

MEGA 1

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	%W/W
Suda Çözünür Bor (B)	% 0,5
Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır)	% 1
Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır)	% 1
Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır)	% 3
EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı (Cu ve Mn) için 3 - 8, (Zn) için 2 - 9	

MEGA 2

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	%W/W
Toplam Azot (N)	% 20
Üre Azotu (N-NH ₂)	% 20

MEGA 5

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	%W/W
Organik Madde	% 30
Organik Karbon	% 13
Toplam Azot (N)	% 1
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 4
pH Aralığı	4 - 6

MEGA 3

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	%W/W
Organik Madde	% 20
Toplam Azot (N)	% 12
Organik Azot (N)	% 2
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	% 10
Maksimum Klor (Cl) Beyanı	% 0,5
Maksimum Nem	% 20
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	% 3
Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır)	% 2
Serbest Aminoasitler	% 15
pH Aralığı	2-4

MEGA 4

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	%W/W
Organik Madde	% 10
Toplam Humik Asit + Fulvik Asit	% 15
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 1
pH Aralığı	6 - 8

BİTKİ	YAĞMURLAMA UYGULAMA	YAPRAK UYGULAMA (Holder ve Pivot)	UYGULAMA ŞEKLİ
AÇIK ALAN SEBZE BİTKİLERİ (Kavun, Karpuz, Biber, Domates, Patlıcan, Salatalık)	Setin Tamamı/5da	Setin Tamamı/20da	Yeşil aksam dönemi, çiçeklenme öncesi ve meyveler yaklaşık fındık büyüklüğüne eriştiğinde 1'er uygulama olmak üzere toplam 3 uygulama yapılır.
TAHİL, YEM, BAKLAGİL ve ENDÜSTRİ BİTKİLERİ (Buğday, Kanola, Pamuk, Fasulye, Mısır, Ayçiçeği)	Setin Tamamı/5da	Setin Tamamı/20da	Tahıllarda kardeşlenme döneminde 1 uygulama tavsiye edilir. Diğer gruplarda ise yeşil aksam dönemi, çiçeklenme öncesi ve meyveler yaklaşık fındık büyüklüğüne eriştiğinde 1'er uygulama olmak üzere toplam 3 uygulama tavsiye edilir.
YUMRULU BİTKİLER (Pancar, Havuç, Patatesi, Turp)	Setin Tamamı/5da	Setin Tamamı/20da	Yumru bağlandıktan sonra 2-3'er hafta ara ile en az 3 uygulama tavsiye edilir.
NARENCİYE (Portakal, Mandalina, Limon)	—	Setin Tamamı/25da	Yeşil aksam dönemi, çiçeklenme öncesi ve meyveler yaklaşık fındık büyüklüğüne eriştiğinde 1'er uygulama olmak üzere toplam 3 uygulama yapılır.
SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELER (Şeftali, Kayısı, Erik, Badem, Kiraz, Ceviz, Zeytin, Fındık)	—	Setin Tamamı/25da	Yeşil aksam dönemi, çiçeklenme öncesi ve meyveler yaklaşık fındık büyüklüğüne eriştiğinde 1'er uygulama olmak üzere toplam 3 uygulama yapılır.
YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVELER (Elma, Armut, Ayva, Üzüm)	—	Setin Tamamı/25da	Yeşil aksam dönemi, çiçeklenme öncesi ve meyveler yaklaşık fındık büyüklüğüne eriştiğinde 1'er uygulama olmak üzere toplam 3 uygulama yapılır.
NOT:	MEGA SET'ten daha iyi sonuç alabilmek için yağmurlama sulamanın son 10 dakikasında uygulama yapılması tavsiye edilir. Ayrıca, serin ve güneşsiz havada bol su ile uygulama yapılmalıdır.		



**CANDEM
GÜBRE
A.Ş.**



**pH DÜŞÜRÜCÜ
TUZLULUK GİDERİCİ**

WATER LIGHT



EC FERTILIZER

WATER LIGHT

KARBOKSİLİK ASİT

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Karboksilik Asit

W/W

40

TAVSİYE	DOZ (100 LT SU)
HERBİSİTLER İLE BERABER	100 cc
İNSEKTİSİTLER İLE BERABER	
FUNGUSİTLER İLE BERABER	
GÜBRELER İLE BERABER	
DAMLAMA SULAMA SİSTEMLERİNDE KIREÇ TEMİZLİĞİNDE	1 lt
İLAÇLAMA ALETLERİNİN TEMİZLİĞİNDE	1 lt



REDUCER DRIP



EC FERTILIZER

REDUCER DRIP

pH Düşürücü / pH Reducer

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Nitrik Asit
Sülfürik Asit
Asetik Asit

W/W

% 5
% 10
% 2

TAVSİYE	DOZ (100 LT SU)
FUNGUSİTLER	10 - 20 cc
İNSEKTİSİTLER	
AKARİTLER	
BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİLER	
MİKRONUTRİETLER	
KÜLTÜR BİTKİLERİNDE	
YAPRAK GÜBRELERİNE	
HERBİSİTLER	20 cc
ISLANMASI GÜÇ BİTKİLERDE	35 cc
DAHA AZ KULLANMAK İÇİN	50 cc





EC FERTILIZER

FreeMixX

KARIŞIM AJANI

TAVSİYE	DOZ (100 LT SU)
FUNGUSİTLER	10 - 20 cc
İNSEKTİSİTLER	10 - 20 cc
AKARİTLER	10 - 20 cc
BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİLER	10 - 20 cc
MİKRONUTRİYETLER	10 - 20 cc
HERBİSİTLER	20 cc
ISLANMASI GÜÇ BİTKİLERDE	35 cc
DAHA AZ KULLANMAK İÇİN	50 cc





Toprak
Geleceğimiz



Toprak
Emanetimiz



Tarım
Medeniyetimiz



Tarım
Hayatımız



Çiftçiler
Yol arkadaşımız



Bereket İin her dem,
toprağın ihtiyaı **Candem...**

CANDEM GÜBRE A.Ş.

Büyük Kayalık OSB. Mahallesi Lalehan Caddesi
No:57/1 Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE

Phone : +90 332 342 00 01

Web : www.candem.com.tr

E-Posta : candem@candem.com.tr

